

Ein Beitrag

zur

Sicherstellung der Diagnose des occulten Rotzes.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades

eines

Magisters der Veterinair-Medicin

verfasst und mit Bewilligung

des Hochverordneten Conseils des Veterinair-Instituts zu Dorpat.

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Rudolf Molkentin.

(Mit einer lithographirten Tafel.)

Ordentliche Opponenten:

Doc. Mag. **W. Gutmann.** — Director Prof. **C. v. Raupach.** — Prof. Mag. **E. Semmer.**

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1883.

Gedruckt auf Verfügung des Conseils des Dorpater Veterinair-Instituts.

Dorpat, den 26. Januar 1883.

Nr. 34.

Director C. Raupach.

Indem ich die nachstehenden Blätter der Oeffentlichkeit übergebe, ergreife ich mit Freuden die Gelegenheit, um meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor E. Semmer, für den mir bei meinen Untersuchungen freundlichst gewährten Rath und Beistand meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die practische Bedeutung der Feststellung der häufig so schwierigen Differentialdiagnose des Pferderotzes, namentlich des occulten Lungenrotzes und der Umstand, dass kleinere Hausthiere empfänglich für das Rotzcontagium sind, führte zu der Idee, mit dem Nasenausfluss rotzverdächtiger Pferde, kleinere Hausthiere, die sich wegen ihrer besonderen Disposition und geringen Werthes hauptsächlich für Versuche eignen, zu impfen, um aus den bei letzteren hervorgerufenen pathologischen Veränderungen sicheren Rückschluss auf das Vorhandensein des Rotzes, ziehen zu können.

Es fragt sich nun, welche Thiere geeigneter zu den Impfversuchen sind und welche Methode der Impfung die sicherste wäre, um mehr positive Anhaltspunkte zur Constatirung des occulten Rotzes zu liefern. Obgleich diese Frage von verschiedenen Autoren berührt wurde und viel Licht über dieselbe durch die gewonnenen Versuchsergebnisse verbreitet worden, so ist sie doch der häufigen negativen Befunde wegen noch nicht zur Genüge aufgeklärt.

Bevor ich zu meinen Untersuchungen übergehe, halte ich es für nöthig, kurze Angaben der Hauptphasen der Geschichte des Rotzes und der Literatur der Uebertragungsversuche auf andere Thiergattungen voranzuschicken.

Im 17. Jahrhundert interessirten sich sehr viele Schriftsteller für die Rotzkrankheit, weil man meinte, daß aus dem Rotz des Pferdes durch Ansteckung beim Menschen Syphilis entstehe. Van Helmont¹⁾ fand eine große Aehnlichkeit des Wurmes mit Syphilis und behauptet, daß letztere zuerst entstanden sei durch Ansteckung des Menschen von einem am Wurm leidenden Pferde. Lafosse²⁾ meinte, gestützt auf die Mittheilungen über den Rotz bei Neapel im Jahre 1494 von Parazzez, daß man vor diesem Jahre in Europa nichts vom Rotz gewußt habe und derselbe während der Belagerung Neapels zugleich mit Syphilis bemerkt worden sei. Doch schon Vegetius³⁾ beschrieb verschiedene Krankheitsformen bei den Pferden unter der Benennung *Malleus humidus*, *Malleus farciminosus* u. f. w. Absyrtus⁴⁾ spricht von einer Aetiologie des Rotzes und Theomnestus⁵⁾ trennt den einfachen gutartigen Nasenrotz bei den Pferden von der bösartigen Form. Die Ansicht, daß Syphilis identisch mit Rotz ist, widerlegte E.

1) Joan Bapt. van Helmont, *Opuscula medica inaudita* Francforti 1862.

2) Abhandlung von dem wahren Sitze des Rotzes bei den Pferden. 1749. Uebersetzung von D. G. Schrebern, Halle 1752.

3) *Mulomedicina s. de arte veterinaria* s. Erdt (Heckers Geschichte).

4) J. Hecker, *Geschichte der Heilkunde* Bd II Berlin 1829.

5) daselbst s. 250.

Semmer⁶⁾ durch Impfungen mit syphilitischem Material bei Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen, die alle negativ ausfielen. Klebs⁷⁾ konnte durch Impfung mit syphilitischem Material bei Hunden, Ziegen, Kaninchen und Meerschweinchen keine syphilitischen Proceßse erzeugen. Zeißl⁸⁾ machte Versuche mit dem Blute Syphilitischer, welches er Kaninchen und Tauben einimpfte, aber mit negativem Resultat. Dagegen haben Bradley⁹⁾ und Ch. Legros¹⁰⁾, ersterer bei einem Meerschweinchen und bei einer jungen Katze durch Inoculation von syphilitischem Material bei dem Meerschweinchen eine örtliche Verdickung an der Impfstelle und später constitutionelle Symptome erzielt, bei der Katze am Ende der 8. Woche syphilitische Gummata in den Nieren und der Leber vorgefunden. Legros hat bei einem Meerschweinchen einige gummaähnliche Knoten in den tieferen Cutischichten gefunden. Anzias Turenne¹¹⁾ spricht von einer jungen Katze, die durch Impfungen mit syphilitischem Material an secundärer Syphilis erkrankte. (Plaques an den Nägeln und Gummata am Kopf) Von Solleyfel, Garfaul¹²⁾ wurde die Contagiosität des Rotzes anerkannt. Gohier¹³⁾ bewies durch Impfung und Zusammenstellen Kranker mit Gefunden die Ansteckungsfähigkeit des Rotzes. Viborg¹⁴⁾ wies nach, daß der Ansteckungsstoff des

6) Resultate der Impfung mit Syphilis bei Thieren von E. Semmer
Oesterreichische Vierteljahrschrift für wissent. Veterinairkunde 1869 Bd. 31.

7) Medicinisches Centralblatt 1879. Das Contagium der Syphilis s. 562.

8) Ziemssen specielle Pathologie und Therapie Bd. III. 1874. S. 41.

9) Dasselbst s. 40.

10) Union medical 18. Brief. Ziemssen Specielle Pathologie und Therapie Bd. III 1874.

11) Recueil, 1866. s. 661.

12) Erdt. die Rotzdyskrasie und ihre verwandten Krankheiten, Leipzig 1863. S. 151.

13) Wörterbuch der Thierheilkunde von Hurler d'Arboval
übersetzt von Renner, Weimar 1839. Bd. III. S. 515.

14) Sammlung von Abhandlungen für Thierärzte. Copenhagen.
S. 334.

Rotzes im Nasenausfluß, Eiter, Speichel, Harn, Blut und Schweiß enthalten sei. Schreber¹⁵⁾ kommt zu folgenden Resultaten:

1) Der Ursprung des Rotzes ist eine scharfe zähe Lymphe, 2) es ist ein Contagium vorhanden, da ein Pferd das Andere ansteckt. 3) diejenigen Pferde, bei welchen die Lymphe vorher verdorben und ebenso die vollblütigen, sind für das Rotzcontagium empfänglicher. Bourgelat¹⁶⁾, Chabert¹⁷⁾ stellen jedoch die Contagiosität des Rotzes in Abrede und Lafosse¹⁸⁾ meint, die ansteckende Natur dieser Krankheit sei nicht erwiesen.

Von Zürn¹⁹⁾ wurden im Blute Rotziger Micrococcen gefunden, dieser Befund wurde bald darauf von Christot²⁰⁾, Kiener²¹⁾, Hallier²²⁾ und Semmer²³⁾ bestätigt. Im Nasenschleim Rotziger fanden sie außer Eiterzellen und epithelialen Fragmenten lebhaft sich bewegende Kugelbakterien, auch im Blute waren Bakterien vorhanden, jedoch weniger zahlreich; meist in und an den farblosen Blutkörperchen haftend. Hallier cultivirte aus dem Rotzblut einen Pilz, *Maleomyces equestris*.

Renault und Bouley²⁴⁾ nahmen eine rotzige Pyämie an. Um die Frage über die pyämische Natur des Rotzes experimentell zu lösen, injicirten sie Eiter in die Venen und erzeugten Geschwüre und Wurmbeulen.

Spinola²⁵⁾ und Günther²⁶⁾ nahmen ebenfalls Eiterinjectionen in die Venen vor, welche zu Eiterheerden in den Lungen

15) Schreber, Anmerkung zur Abhandlung des Herrn Lafosse. Halle 1752. S. 62.

16, 17) Oesterreichische Monatsschrift. Ueber das Rotzcontagium von E Semmer 1878.

18) Lafosse, Abhandlung über den wahren Sitz des Rotzes bei den Pferden. Uebersetzung von Schreber 1752.

19) Zoopathologische Untersuchungen. 1872, p. 36.

20, 21, 22) Recueil de médecine vétér. 1868—69

23) Vorträge für Thierärzte. Heft III und IV. S. 125.

24) Recueil von 1840.

25) Handbuch der Speciell. Patholog. und Therapie. Bd. II, 1863.

26) Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde. 1841.

und anderen Organen führten und bewiesen, daß es nicht specifische Rotzbildungen sind. Nach einigen Autoren wurde der Rotz für eine Tuberculose angesehen. Gerlach²⁷⁾ und Leifering²⁸⁾ sprechen gegen die tuberculöse Natur des Rotzes. Das charakteristische des Rotzes liegt in der Oertlichkeit, im gesammten Krankheitsverlaufe und im Ansteckungsvermögen. Galtier²⁹⁾ cultivirte Rotzvirus-Organismen bis zur 5. Generation und erzeugte Rotz beim Esel mit langsameren Verlauf. Dr. Löffler und Dr. Schütz³⁰⁾ constatirten Bacillen in Rotzknötchen, die in urfächlicher Beziehung zur Rotzkrankheit stehen, sich in Blutserum cultiviren lassen und verimpft bei Kaninchen, Hunden, Mäusen und Pferden Rotz erzeugten.

27) Jahresbericht d. königl. Thierarzneischule zu Hanover. 1868.

28) Bericht über das Veterinairwesen in Sachsen pro 1866.

29) Archives veterine d'Alfort. Referat im Thierarztl. XX. Jahrgang 1861.

30) Vorläufige Mittheilung über die Entdeckung der Bacillen des Rotzes. Deutsche Medicinische Wochenschrift Nr. 52. 1882.

Literatur der Impfversuche.

Viborg¹⁾ stellte eine große Anzahl von Impfungen an Pferden mit Nasenausfluß rotziger Pferde, Rotzeiter, Speichel, Schweiß, Urin und Blut an und wies die Ansteckungsfähigkeit des Rotzes nach. Es gelang ihm jedoch nicht Rotz zu erzeugen, wenn er Blut, welches rotzigen Pferden entnommen war, auf die unverletzte Haut und Nasenschleimhaut gebracht hatte, sondern nur dann, wenn er es in die Blutbahn injicirte.

Gohier²⁾ bewies durch Impfversuche und Beobachtungen, daß der Rotz sowohl durch Impfungen als Cohabitation, Geschirre u. f. w. übertragbar sei.

Schilling³⁾ constatirte durch Rückimpfung vom Menschen auf zwei Kaninchen die Disposition der Kaninchen für das Rotzgift.

Renault und Bouley⁴⁾ führten Impfungen mit Rotzeiter an vier Hunden aus, erhielten aber nur locale Entzündungszufälle. Die Fortsetzung dieser Versuche veranlaßte aber die Autoren zu dem Ausspruche: der acute Rotz sei durch Inoculation unzweifelhaft auf Hunde übertragbar. Im nächsten Jahre ergaben Impfungen an 6 Hunden, 4 Kühen, 3 Schafen und 6 Kaninchen negative Resultate; vergleichsweise wurden ebenso viel Pferde geimpft,

1) Sammlung von Abhandlungen für Thierärzte etc. II. Bd. Copenhagen 1797.

2) Journal de médecine vétérinaire T. XVII. pg. 145.

3) Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde XI. Bd. 1821.

4) Gazette médicale de Paris 1843 Nr. 6 u. 7. S. 99.

welche alle an Rotz erkrankten. Die Uebertragbarkeit des Rotzes auf andere Thiere mußte nun verneint werden.

Wirth⁵⁾ impfte eine Ziege mit dem Nafenausfluß eines chronisch rotzigen Pferdes an drei verschiedenen Stellen der unteren Schwanzfläche, am 4-ten Tage beobachtete er Entzündung an der Impfstelle und bald darauf Fieber. Nach 21 Tagen starb das Thier; bei der Section fanden sich Verschorfung der Weichtheile an der Impfstelle, zahlreiche miliäre Knötchen in der Lunge und Auflockerung der Nasenscheidewand.

Ercolani⁶⁾ beobachtete einen Fall von zufälliger Ansteckung. In einem Stalle, in welchem im Verlaufe von 15 Monaten fünf Pferde rotzig wurden, stand eine Ziege vier Monate hindurch. Es wurde zuerst ein Absceß am Euter bemerkt; dieser wurde entleert, ohne daß Besserung eintrat; es bildeten sich mehrere kleinere Abscesse daselbst. Das Thier wurde traurig, fraß wenig. Aus der Nase zeigte sich ein dicker klebriger Ausfluß. Die Section ergab auf der Nasenschleimhaut zahlreiche Geschwüre, eitrige Infiltration der vergrößerten Kehlgedrüsen, Knötchen in den Lungen und Abscesse im Euter.

Nordström⁷⁾ berichtet von zwei Hunden, die durch Genuß des Fleisches rotzkranker Pferde erkrankten. Die Hunde starben, nachdem sich ein blutiger Nafenausfluß, Röthung der Augen und ödematöse Anschwellung des Kopfes eingestellt hatten.

Decroix⁸⁾ behauptet, gestützt auf Impfungen, die er an 6 Hunden vornahm, von denen drei eingingen, zwei genasen und einer Abhanden gekommen war, daß sowohl der acute, als auch

5) Archiv für Thierheilkunde VI. Bd. S. 22. 1844.

6) Il medico veterinario vol. II 1861. und Repertorium der Thierheilkunde XXIII. Bd. S. 86.

7) Tidskrift för Veterinairer Stockholm 1862 u. Inaugural Diss. Schimming Dorpat 1875.

8) Journal de méd. vétérinaire militaire Bd. II und im Recueil 1866 S. 254.

chronische Rotz auf Hunde übertragbar sei. Das Gift habe stets nur local gewirkt und an der Impfstelle ein ulcerirendes Geschwür hervorgerufen. In zweien dieser Fälle bildeten sich secundär Wurmknotten in der Nähe der Impfstelle. In einem Falle von Wurmbeulen complicirte sich die Krankheit mit Symptomen des Nasenrotzes.

Leifering⁹⁾ impfte eine Katze an den Hinterchenkeln und der Nase mit Rotzeiter. Es trat bald darauf bei diesem Thiere ein Allgemeinleiden ein, das sich durch geringe Fresslust und Traurigkeit zu erkennen gab. Die Impfstellen nahmen sehr bald das Ansehen von Wurmgeschwüren an, hatten weißliche aufgeworfene Ränder und sonderten eine dünne eiterähnliche Flüssigkeit ab. Die Nase schwellt äußerlich stark an und das Thier hatte beträchtliche Athmungsbeschwerden. Am 10. Tage nach der Impfung verendete die Katze. Die Nasenschleimhaut war nur an ihrem unteren Theile afficirt und hyperämisch; um die Nase herum machte sich, außer einer geschwürigen Zerstörung der äußeren Haut eine starke gallertartige gelbliche Infiltration im Unterhautbindegewebe bemerklich.

Gerlach¹⁰⁾ sah eine Anatomie-Katze, die vom rotzigen Fleisch eines Pferdes gefressen hatte, unter Hautgeschwüren und Drüenschwellung zu Grunde gehen. Er impfte drei Schafe mit Rotzeiter, von denen bekam eins nach sechs Tagen an der Impfstelle ein Geschwür, das nach weiteren 8 Tagen mit Zurücklassung einer wulstigen Verdickung heilte. Das zweite bekam schon am fünften Tage an der Impfstelle ein Rotzgeschwür und starb am 15. Tage am ausgebildeten Rotz, ebenso das 3. Thier, bei dem nach einigen Wochen, nachdem die Impfwunde verheilt war, Nasenausfluß und Schwäche sich einstellten und der Tod nach 7 Monaten nach stattgefundenener Impfung eintrat. Die ganze

9) Bericht über das Veterinairwesen in Sachsen 1864.

10) Jahresbericht der Königl. Thierarzneischule zu Hannover s. 116. 1868.

Schleimhaut der Nase war gefchwülig zerstört und mit kleinen und größeren Rotzgeschwüren versehen; die Nasenscheidewand war an einer Stelle durchgefren.

Gerlach erklärte die Kaninchen für das Rotzcontagium ebenso empfänglich, wie das Schaf. Schweine zeigen bei Impfungen mit Rotzeiter nur geringe locale Erscheinungen, ohne weitere Folgen. Bei Hunden sah er nur eine locale Infection, die nach 14 Tagen verschwunden war. —

Rivolta¹¹⁾ berichtet über rotzige Kaninchen, die sich durch den Aufenthalt in einem mit rotzigen Pferden besetzten Stalle inficirt hatten.

Hering¹²⁾ machte 6 Versuche mit Infusion von Rotzblut auf gesunde Pferde. Er giebt an, kein positives Resultat erhalten zu haben.

Siegmund¹³⁾ impfte mit Blut und Eiter von einem rotzkranken Menschen ein Kaninchen und Pferd auf der Nasenscheidewand und an einer Stelle der Haut. Bei beiden Impfsthieren fand Rotzknötchenbildung statt.

Brigidi¹⁴⁾ injicirte Blut eines an Rotz verstorbenen Menschen in die Venen mehrerer Kaninchen. Die Kaninchen wurden nicht angesteckt; dagegen hatten Impfungen unter die Haut den Tod eines Kaninchens unter charakteristischen Rotzererscheinungen zur Folge.

Hertwig¹⁵⁾ impfte drei Ziegen in verschiedener Weise: eine Ziege, die gleichzeitig an der Nase und am Halse geimpft wurde, zeigte schon nach 24 Stunden eine heftige Entzündung beider Impfstellen. Nach 48 Stunden war die ganze linke Seite

11) Gior. di med. vetér. 1868. 69. p. 241; ref. von Leisering in Virchow's Jahresbericht f. 1869. I. S. 529.

12) Repertorium der Thierheilkunde 1871 S. 20—30.

13) Correspondenzblatt für Schweizerärzte 1873.

14) Le Sperimentale 1873. Virchow u. Hirsch, Jahresbericht.

15) Magazin für die gesammte Thierheilkunde. Bd. 40. 1874.

des Kopfes und Halses angeschwollen, dunkelroth, aus der Nase floß eine klebrig-bräunliche Flüssigkeit. Unter Fortdauer dieser Erscheinung magerte das Thier rasch ab. Am 6. Tage wurde der Nasenausfluß blutig, übelriechend, die Impfwunde am Halse war brandig, der Tod erfolgte schon am 11. Tage. Bei der Section fanden sich auf der gerötheten Nasenschleimhaut links kleine gelbliche Erhöhungen, die meist central geschwürig zerfallen waren. Anschwellung der Lymphdrüsen am Kopf und Hals, in den Lungen viele gelbliche Knötchen. Bei den übrigen Ziegen, bei denen die Impfungen, wie bei vier Schafen nicht gelungen waren, zeigte sich eine vorübergehende geringe Entzündung und ein dünner Schorf, der in 14 Tagen abheilte. Gestützt auf Impfungen bei Hunden, spricht Hertwig dem Hunde nur eine geringe Empfänglichkeit für das Rotzcontagium zu.

Friedberger¹⁶⁾ giebt an, daß etwa die Hälfte sämmtlicher, mit Rotzproducten geimpfter Kaninchen, an Rotz erkrankten. Von 10 geimpften Kaninchen wurden vier rotzig.

Schimming's¹⁷⁾ Versuche bestehen in sechs Transfusionen und einer subcutanen Injection mit Blut von zwei rotzigen Pferden. Einem alten weissen Hunde wurden $1\frac{1}{2}$ Dr. Blut subcutan auf dem Rücken beigebracht. Nach zwei Monaten fand sich an der Injectionsstelle eine mehr oberflächliche Ulceration, die ein flaches mit einem speckigen Grunde und unregelmäßigen Rändern versehenes Geschwür bildete. Dieses Geschwür war theilweise mit braunen Krusten bedeckt und secernirte einen dünnen grauen Eiter. Ebenfolche Geschwüre hatten sich secundär auf der äußeren Fläche beider Schenkel unterhalb des Kniegelenks gebildet. Das Geschwür auf dem linken Schenkel war besonders ausgezeichnet durch seine rundliche Form, aufgeworfene Ränder

16) *Revue für Thierheilkunde*. Bd. III, Nr. 8, von E. Semmer.

17) *Zur Frage über die Ansteckungsfähigkeit des Rotzblutes*. Inaug. Dissert. v. Schimming. Dorpat, 1875.

und Sclerofirung der daselbe begrenzenden Haut. Auf der linken Brustwandung machte sich unter der Haut ein derber Knoten bemerkbar, der nach längerer Zeit abscedirte, sich öffnete und einen dünnflüssigen grauröthlichen Eiter entleerte. $2\frac{1}{2}$ Monat nach der Impfung hatte sich noch eine zweite Beule auf derselben Brustwandung gebildet, die einen ähnlichen Verlauf annahm. Section. Auf dem Rücken ein Geschwür von der Grösse eines Silberrubels. Das Unterhautbindegewebe des rechten Carpus und rechten Tarsus fulzig infiltrirt, von thrombosirten Blutgefäßen durchsetzt. Im rechten Hoden ein begrenzter grauer, käsiger Knoten, desgleichen im linken kleine tuberkelähnliche Knötchen. Bei der microscopischen Untersuchung ergab sich, daß diese Knötchen aus kleinen Granulationszellen und Detritusmassen bestanden. Auf der Vorderfläche des Metacarpus und Carpus, ferner über dem Sprunggelenk, zwischen der Achillessehne und der Sehne des Musc. flexor. profund., endlich auf der Vorderfläche des Metatarsus fanden sich mit chocoladefarbiger Jauche gefüllte Abscesse. Die Rückimpfungen auf ein Pferd gaben bei der Section weder auf der Nasenschleimhaut, noch in den Lungen irgend welche dem Rotz eigenthümliche pathologische Veränderungen. Die angeführten Transfusionen von $1\frac{1}{2}$ Dr — 2 Dr defibrinirten Blutes bei einem Kater, einer Hündin, einem jährigen Eber, einem zweijährigen und einem anderen vier Monate alten Schaf ergaben negative Resultate. Die Transfusion von 1 ♂ undefibrinirten, von einem rotzigen Pferde stammenden Blutes, bei einem Pferde ergab nach 18 Tagen keine Erscheinung der Infection. Darauf wurden $2\frac{1}{2}$ ♂ rotzigen Blutes demselben Pferde beigebracht. Nach einem Monat bemerkte Schimming einen Ausfluß eines gelblichen Schleimes an dem rechten Nasenloch und Anschwellung der rechten Kehlgangsymphdrüse, darauf traten auf der Nasenscheidewand Geschwüre auf und das Thier ging bald unter großer Schwäche ein. Die Section ergab: die Schleimhaut der Nasenscheidewand der rechten Nasenhöhle von

schmutzig-grünlicher, theilweise von brauner Farbe und mit zähem Schleim bedeckt. Auf dem unteren Theile der Nasenscheidewand zahlreiche Geschwüre und Auflagerungen von käfigen Massen, hie und da Rotzknötchen von weißer Farbe und von der Größe einer Erbse. — Dieselben Veränderungen auch in der anderen Nasenhälfte, nur weniger intensiv. Das Lungengewebe durchweg dicht von Rotzknoten durchsetzt, die ein weißliches Aussehen, die Consistenz der Gehirnmasse und die Größe einer Erbse bis Bohne, haben. Die microscopische Untersuchung erweist, daß die Knoten aus Rundzellen und käfigen Zerfallsmassen bestehen. Schimming zieht aus diesem Versuche den Schluss, daß 1 ♂ Blut von einem an chronischem Rotz leidenden Pferde auf ein gesundes transfundirt nach Verlauf von 18 Tagen keine nachweisbare Rotzsymptome verursacht. — Nach Transfusion von 2 ♂ treten nach 80 Tagen die Symptome des Rotzes deutlich hervor und 30 Tage nachdem geht das Thier ein. Das Blut von rotzigen Pferden scheint nach Schimming auf gesunde weniger intensiv zu wirken, als die pathologischen Secrete, wie Nasenausfluß, Rotzeiter etc.

Bollinger¹⁸⁾ impfte Kaninchen an den Ohren mit eiterigem Geschwürsbeleg aus der Nase eines rotzigen Pferdes. Im Verlauf der nächsten Tage zeigte sich an den Impfstellen eine sehr deutliche entzündlich-eitrige Reaction. Die Umgebung war stark injicirt und geröthet; nach einigen Wochen bildeten sich fressende Rotzgeschwüre, die Thiere magerten ab, bekamen Athembeschwerden und Nasenausfluß und gingen ein. Section: Zerstörung des Ohrknorpels, Lymphangitis der entsprechenden Lymphgefäße, metastatische Rotzknoten der Stirnhöhlen und Stirn-

18; Beiträge zur experimentellen und vergleichenden Pathologie des Rotzes v. Bollinger. Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin. Bollinger u. Frank, II. Bd 1876.

beine, Rotzknoten und Geschwüre der Nasenschleimhaut entzündliche Schwellung der Kehlgangsdrüsen, Rotzknötchen der Lungen.

Bollinger beobachtete eine spontane Infection eines Kaninchens durch längeres Zusammenleben mit künstlich rotzig inficirten Kaninchen; es hatte während des Lebens Nasenausfluß. Die Autopsie ergab Nasenrotz mit Perforation der Nasenscheidewand, rotzige Wucherungen auf den Muscheln und in der Highmorshöhle, beginnende Ufur der Nasenbeine, entzündliche Schwellung der Kehlgangsdrüsen. Impfung mit frischem Blute eines rotzigen Pferdes auf ein Kaninchen ergab ein negatives Resultat; die Impfungen mit Rotzzeitern bei Ziegen nach $5\frac{1}{2}$ —7 Wochen das klinische Bild des acuten Rotzes; eitriger mischfarbiger Nasenausfluß; häufiger Husten. Anschwellung der Kehlgangsdrüsen, Athembeschwerden, Bildung von Knötchen und Geschwüren auf der Nasenscheidewand. Tod 9 Wochen nach der Impfung. Section: Rotzknoten und Geschwüre der Nase, Lymphangitis; zahlreiche, bis bohnen-große Rotzknoten des Bauchfells und der Lungen. Rotzeruptionen an den Impfstellen, milliäre Rotzknötchen an der Nasenscheidewand. Rotzgeschwüre an den Ohren erhielt Autor bei einem Schafe in 5 Tagen nach der Impfung. Tod nach $6\frac{1}{2}$ Tagen, so das Bollinger in seiner Schlußfolgerung das Schaf, die Ziege und das Kaninchen zu den für die Aufnahme des Rotzgiftes überhaupt disponirten Thieren zählt.

E. Semmer¹⁹⁾ spricht sich nach einem kurzen historischen Ueberblicke der Arbeiten, welche über die Frage der Contagiosität des Rotzes angestellt worden, positiv für die Uebertragung des Rotzes auf andere Thiere aus. Zur Entscheidung der Frage, wie rasch nach der Ansteckung das Blut inficirter Thiere ansteckungsfähig wird, sind folgende Versuche ausgeführt worden. Einem alten gefundenen Pferde wurden 4 grm Nasenschleim von

19) Oesterreichische Monatsschrift für Thierheilkunde Ueber das Rotzcontagium. 1878.

einem rotzkranken Thiere theils subcutan auf den Glutaeen beigebracht, theils auf die Nasenschleimhaut applicirt. Am fünften Tage wurde von dem geimpften Thiere Blut aus der Vena Jugularis entnommen und kleine Quantitäten subcutan 4 Kaninchen beigebracht. Zwei gingen an Septicaemie zu Grunde, zwei starben, das eine 4, das andere 9 Wochen nach der Impfung, beide sehr abgemagert, aber ohne Spuren von Rotz. Das geimpfte Pferd fiel drei Wochen nach der Impfung am acuten Lungen- und Nasenrotz. Aus diesem Umstande, dafs keins von den Kaninchen rotzig wurde, wird der Schluss gezogen, dafs das Blut am 4. Tage nach der Impfung noch keine Ansteckungsfähigkeit besitzt.

Von A. Unterberger²⁰⁾ wurde ein Kaninchen mit dem blutigen Schaum aus der Lunge eines rotzigen Pferdes am Ohr geimpft. An der Impfstelle entstand ein Ulcus rodens, durch welches die Ohrmuschel perforirt wurde. An der Basis entstand ein zweites flaches Geschwür; das Kaninchen verendete. Bei der Section fanden sich Lungen, Leber und Milz von zahlreichen kleinen punktförmigen Knötchen durchsetzt, die vorzugsweise aus kleinen, granulirten, theils in Fettmetamorphose und Zerfall begriffenen Zellen gebildet wurde. Bei einem anderen in gleicher Weise geimpften Kaninchen, blieb die Impfung ohne Erfolg.

St. Cyr. und Delarbeyrette²¹⁾ stellen Impfungen mit Rotz an sieben Hunden an. Die Versuche fielen positiv aus, und sie sahen sich zu der Schlussfolgerung berechtigt, dafs der Rotz auf Carnivoren übertragbar sei. Die Krankheits Symptome waren im Allgemeinen folgende: am 3. Tage stellte sich Entzündung mit leichter Schwellung, Hitze und Schmerz in der Umgebung der Wundfläche ein. Die Wundfläche bedeckte sich mit einer

20) Zeitschrift für Thiermedizin und allg. Pathologie. Bollinger und Frank. 1876

21) Journal de médecine vétér. 1866 u. Annales de méd. vétér. 1864.

Kruste, die durch einen dünnflüssigen Eiter abgestossen wurde, so dafs ein nacktes Geschwür entstand, das sich allmählich vergrößerte. Die Gestalt des Geschwürs ist unregelmässig, die Ränder indurirt, die Farbe deselben röthlich oder braunroth.

Im Verlaufe von anderthalb Monaten findet eine vollständige Vernarbung der Geschwüre statt. In der grösseren Zahl der Fälle stellt sich am 3—5 Tage Nasenausfluss ein, der anfangs klar, flüssig, später aber eiterartig wird. Später tritt Schwellung der Lymphdrüsen und circumscribte Entzündung des Unterhautbindegewebes ein. Es tritt Abmagerung, beschleunigte Respiration und Circulation ein. Alle 7 Versuchsthiere genesen. Controlversuche wurden mit saniösem Eiter aus der Widerrüstkiste eines nicht rotzigen Pferdes, welcher die 7 mit Rotz geimpften begleitete, angestellt. Im Laufe von 18 Tagen traten keine besonderen Krankheitserrscheinungen bei den mit Eiter geimpften, ein; die Impfstellen waren unterdessen per primam intentionem geheilt, ohne dafs eine entzündliche Schwellung eingetreten wäre. Diese Versuche sind oft wiederholt worden und haben immer ein gleiches Resultat gegeben. St. Cyr zieht nun aus allen diesen Resultaten folgende Schlüsse: 1) Rotz ist keine den Einhufern allein zukommende eigenthümliche Krankheit. 2) Rotz ist auf Hunde übertragbar. 3) Derselbe tritt bei letzteren in Form von entzündlichen Ulcerationen, Nasenfluss und Schwellung der Lymphdrüsen auf; chanceröse Ulcerationen fehlen oft. 4) Beim Hunde ist der Rotz in der Regel sehr gutartig, mit Ausnahme der Fälle, wo das Gift direct in die Blutbahn injicirt wird; vielleicht niemals tödtlich. 5) Trotz der Gutartigkeit bei Hunden, behält der Rotz seine volle Wirksamkeit, so dafs er, auf Einhufer zurückgeimpft, unfehlbar bei diesen den Rotz erzeugt.

E. Semmer²²⁾ impfte mit dem Nasenausfluss eines rotzverdächtigen Pferdes 1878 ein Kaninchen an beiden Ohren; ferner

22) Revue, Zur Diagnose des Lungenrotzes 1880 Bd. III. Nr. 8.

wurde einem Hunde 4 gramm. mit Wasser verdünntes Blut des Pferdes subcutan beigebracht und einem anderen Hunde der Nasenschleim des rotzverdächtigen Pferdes subcutan applicirt. Sämmtliche Impfwunden heilten schnell, die Versuchsthiere blieben vollkommen gesund. Das rotzverdächtige Thier wurde noch einige Zeit der Beobachtung unterzogen und als gesund entlassen. Im Jahre 1879 wurden vom Autor vier Kaninchen Nasenschleim und Blut von einem rotzverdächtigen Pferde in zahlreiche Schnittwunden an den Ohren gebracht. Sämmtliche Impfstellen heilten bald ohne jegliche nachtheilige Folgen für die Versuchsthiere zu hinterlassen. Das rotzverdächtige Pferd besserte sich, Nasenausfluß und Drüenschwellung schwanden und das Thier konnte als gesund entlassen werden. Im November 1879 wurde ein rotzverdächtiges Pferd mit Nasenausfluß und Schwellung der Kehlgangsdrüsen in die Klinik gebracht. Mit dem Nasenausfluß desselben geimpfte Kaninchen blieben gesund. Da das Pferd nicht mehr präsentirt wurde, so muß angenommen werden, daß es ebenfalls gesund blieb.

Eine große Reihe von Verfütterungen des Fleisches und der Lungen rotziger Pferde an Hunden und Katzen wurde in der pathologischen Abtheilung des Dorpater Veterinair-Instituts²³⁾ ausgeführt; die Resultate waren alle negativ. Injection von Pilzsporen und Micrococcen, die aus Rotzblut cultivirt waren, in die Vene eines Füllens erzeugten keinen Rotz. Ein mit Nasenausfluß eines rotzigen Pferdes getränktes Haarfeil durch die Haut eines Füllens gezogen erzeugte keinen Rotz; die Wunde heilte mit Hinterlassung einer Narbe. Ein altes gesundes Pferd, welches mit einem rotzigen in einem Stalle stand, aber getrennt durch einen breiten Gang und zwei Gitterwände inficirt sich und bekam hochgradigen Lungenrotz.

23) Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin u. vergleichende Pathologie. Ueber die Uebertragbarkeit des Rotzes etc. von E. Semmer, II. Bd. 1876

Nach Galtier²⁴⁾ hat man bekanntlich bei Rotzverdacht zur Sicherstellung der Diagnose empfohlen Kaninchen zu impfen. Galtier macht darauf aufmerksam, daß die Kaninchen sich mitunter immun gegen das Rotzgift verhalten; die Ueberimpfung auf Kaninchen ist daher nicht immer zuverlässig. Nach den Experimenten Galtier's wirkt der Speichel rotziger Pferde ansteckend, er kann zu erfolgreichen Inoculationen benutzt werden; wahrscheinlich beruht seine Infektionskraft auf seine Vermischung mit Trachealschleim. Das Rotzvirus verliert seine virulente Kraft nach einer 15tägigen vollständigen Austrocknung, noch sicherer nach Verlauf von 1—2 Monaten. — Der auf Kaninchen inoculierte Rotz gleicht in seinen Symptomen nicht dem Pferderotze, er ähnelt nach seinen Läsionen der purulenten Infection, so durch die localen käfigen Heerde im subcutanen Bindegewebe und in den Lymphdrüsen; selten trifft man hier Läsionen auf den Schleimhäuten und in den Lungen an.

Der Rotz läßt sich vom Esel auf Kaninchen übertragen.

Nach Galtier²⁵⁾ ist der Hund für Rotzimpfungen empfänglicher, als das Kaninchen; zahlreiche Versuche blieben bei keinem Hunde erfolglos, aber die Zufälle bleiben gewöhnlich auf die Impfstelle beschränkt. 3 bis 7 Tage nach der Inoculation bemerkt man hier Turgescenz, es bildet sich eine kleine ulcerirende Wunde, welche einem chronischen Wurmgeschwür des Pferdes gleicht und einen verkrustenden milchfarbigen Eiter secernirt; mit der Zeit (nach 8—30 Tagen) frisst die Wunde in die Tiefe und vergrößert sich, vernarbt aber schließlich ohne weitere Folgen. Mitunter brechen an den Schenkeln oder auf dem Rücken secundäre Geschwüre hervor, doch auch alsdann tritt wieder Gesundheit ein.

24) Galtier Rec. de méd. vét. Nr. 21. 1880. Ref im Thierarzt Versuche mit Rotz Nr. 2. XX. Jahrgang 1881.

25) Archives veterine d'Alfort. Ref. im Thierarzt XX. Jahrg. Nr. 5. 1881. Die Inoculation des Rotzes auf Hunde.

Für eine allgemeine Infection spricht auch der Umstand, daß die Einimpfung der Drüse von der Flanke eines geimpften Hundes beim Esel Rotz erzeugt.

In zweifelhaften Fällen können somit Hunde als reagirende Versuchsobjecte verwendet werden; selbst wiederholte Impfungen z. B. wie 4—5 mal innerhalb 6 Monaten vorgenommen, machen sie nicht immun, aber die Empfänglichkeit für das Rotzvirus schwächt sich mehr und mehr ab. Cultivirtes Rotzvirus bis zur 5. Generation verursacht beim Esel einen Rotz mit langfamerem Verlauf, der Tod erfolgt dann erst nach 3—4 Wochen.

Siedamgrotzky²⁶⁾ impfte fünf Kaninchen mit Rotzgift, von welchen zwei keine Infectionsercheinungen zeigten, während in 3 Fällen die Versuchsthiere an Septicämie zu Grunde gingen.

Pütz²⁷⁾ kann nicht die Kaninchen-Rotzimpfung als vielversprechend für diagnostische Zwecke empfehlen. Die zu den fraglichen Versuchen verwendeten Kaninchen starben innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Impfung theils an Septicaemie: bei einigen verschwanden die localen Impfercheinungen, während in den inneren Organen chronische Rotzproceße auftraten, die Monate lang occult verliefen.

Von 6 etwa 10 Wochen alten Hunden wurden 3 mit Rotzgift geimpft, 3 wurden nicht geimpft, blieben aber mit den Impflingen längere Zeit zusammen. Die geimpften starben am 16., 22. und 25. October an Hautrotz; die nicht geimpften starben in Folge spontaner Infection am 19. October, 17. und 19. November an Hautrotz, mit Nasencatarrh verbunden. — Autor meint die Hunde besitzen eine große Empfänglichkeit für das Rotzgift.

26) Bericht über das Veterinairwesen im Königreiche Sachsen für das Jahr 1876, S. 72 und 73.

27) Die Seuchen und Heerdekrankheiten unserer Hausthiere von Dr. H. Pütz. Stuttgart 1882. S. 386.

Krajewski²⁸⁾ inficirte Katzen 1) vermittelt Fütterung mit rotzigem Pferdefleisch, 2) durch Impfung mit eiterigem Nasenschleim und Blut rotziger Pferde. Die Empfänglichkeit der Katzen gegen das Rotzcontagium ist nicht bei allen gleich. Ueberhaupt gelangt Autor durch Impfungen zu dem Schlusse: das junge schwache Katzen viel empfänglicher gegen das Rotzcontagium sich verhalten, als alte kräftige, deren Organismus wahrscheinlich einen ungeeigneten Nährboden für den Rotz darbietet. — Außerdem kamen Fälle vor, wo nach mehreren Impfungen keine Infection stattfand. Bei den subcutanen Injectionen erhielt Autor dieselben Resultate, wie Galtier bei den Hunden: chanceröse, wurmige Geschwüre an Stellen der Impfung, die nach 2 oder 3 Wochen verheilten und Narben hinterliessen. Oft entstanden secundär an anderen Stellen des Körpers Geschwüre. Von einer ganzen Menge Katzen wurden nur 15 Katzen inficirt, bei den übrigen blieb eine Infection aus oder es traten locale Entzündungen, Geschwüre auf.

Schäfer²⁹⁾ folgert aus seinen Impfversuchen, dass 1) Inoculation von Rotzgift auf Kaninchen öfter das erwartete Resultat nicht ergeben und kein ausgeprägtes Bild dieser Krankheit; 2) die Zeit zwischen Impfung und vollkommener Ausbildung des Rotzes beim Kaninchen eine bedeutend längere ist, als z. B. beim Pferde; 3) das die Impfung am sichersten und raschesten zum Ziele führt, wenn die Impfung von Pferd zu Pferd geschieht.

Von Dr. Löffler und Dr. Schütz³⁰⁾ wurden in den Producten der Rotzkrankheit nach Behandlung mit Methylenblau und

28) Переносимость контагія лошадиного сапа на плотоядныхъ животныхъ. Архивъ Ветер. Наукъ, кн. III., стр. 122. 1882 г.

29) Versuche über die Uebertragbarkeit des Rotzes von Thier auf Thier. Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin, Bollinger und Frank. Bd VIII S. 148.

30) Vorläufige Mittheilung über die Entdeckung des Bacillus der Rotzkrankheit, Dr. Struck. Deutsche Medic. Wochenschrift. Nr. 52 1882.

nachher mit verdünnter Essigsäure, hin und wieder unter dem Microscop feine Stäbchen entdeckt, welche ungefähr die Grösse von Tuberkelbacillen hatten. Um Gewissheit zu erhalten, ob diese Stäbchen in ursächlicher Beziehung zur Rotzkrankheit stehen, wurden Culturen durch 4 Generationen einen Monat lang fort gezüchtet. Die 4te einzig und allein aus den feinen Bacillen bestehende Cultur wurde einigen anscheinend gefunden Pferden auf verschiedene Stellen beigebracht. Schon nach wenigen Tagen zeigten sich an den Injectionsstellen diffuse, teigige Anschwellungen, die zu Geschwüren wurden und schliesslich trat das klinische Bild des Rotzes hervor, welches die Section später bestätigte. Die Reinculturen der Stäbchen wurden auf Kaninchen, Mäuse und Meerfchweinchen mit Erfolg verimpft. Bei einzelnen Kaninchen zeigten sich bei der Section nur locale Geschwüre und Anschwellungen der entsprechenden Drüsen, dagegen bei Anderen stellte sich das exquisite Bild des Rotzes dar. Die Impfungen mit Rotzculturmaterial bei den weissen Mäusen lieferten negative Resultate, positive Ergebnisse aber bei den Feldmäusen. Ueberraschend günstig sind die Ergebnisse bei den Meerfchweinchen. Schon am 3ten bis 4ten Tage nach der Impfung entwickelte sich constant ein Geschwür mit indurirtem Rande. Anschwellungen verschiedener Körpertheile und Entwicklung ulcerativer Proceffe in der Nasenhöhle, so dass bei der Section das typische Bild des Rotzes sich vorfand.

Diese wichtige Entdeckung von L ö f f l e r und S c h ü t z scheint alle weiteren Versuche zur Sicherstellung der Diagnose zweifelhaften Rotzes überflüssig zu machen, denn wenn man mit dem Microscop in der Hand den Rotz an den etwa vorhandenen charakteristischen niederen Organismen diagnosticiren kann, so bedürfte es keines weiteren Verfahrens. — Die Sache ist aber nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheint; denn 1) hat nicht ein jeder practisirende Veterinairarzt ein so gutes Microscop und die nöthigen Hülfsmittel, und Farbstoffe zur Ver-

fügung, wie sie zur Darstellung der Rotzbacillen erforderlich sind und 2) sind nicht immer Rotzneubildungen vorhanden, in denen man die Bacillen nachweisen kann. Es handelt sich manchmal um einen verdächtigen Nasenausfluß, in welchem die Rotzbacillen zu Micrococcen zerfallen, mit anderen zufällig hineingerathenen niederen Organismen gemengt, vorkommen und eine absolut sichere Diagnose unter dem Microscop nicht gestatten. In allen solchen Fällen wird die Rotzimpfung mit dem verdächtigen Nasenausfluß ihren Werth behalten, und daher habe ich es unternommen durch folgende Versuche die Diagnose des occulden Rotzes oder der verdächtigen Fälle durch Impfung auf andere Thiere festzustellen.

Eigene Versuche.

Brauner Wallach Nr. I, sechs Jahr alt wurde vom Besitzer am 16. November 1881 der hiesigen Klinik in folgendem Zustande zugeführt: das Thier ist ziemlich wohlgenährt; aus beiden Nasenöffnungen erfolgt reichlicher Ausfluss eines weissgelblichen, zähen Schleimes, Schwellung der Lymphdrüse des Kehlgangs der rechten Seite: die Drüse unschmerzhaft von der Grösse eines Hühnereies. Auf der Schleimhaut des Septum narium 2—3 Zoll von der Nasenöffnung entfernt, besonders auf der rechten Seite 2—3 strahlige weissliche Narben; die Schleimhaut catarrhalisch. In der linken Nasenhöhle auf der Nasenscheidewand einige hanfkorn-grosse weissliche Knötchen. Athem beschleunigt — Huften nicht vorhanden; Appetit gut; Puls 40; Temperatur 38,1. Es wurde für rotzverdächtig erklärt und in die Klinik aufgenommen.

Der Nasenausfluss dauerte während der ganzen Zeit der Beobachtung fort. Am 21. December 1881 wurde das Thier durch den Nackenstich getödtet. Section: Auf der Schleimhaut des Septum narium der rechten Nasenhöhle einzelne Erosionsgeschwüre und mehrere strahlige, weissglänzende Narben, einige wenig prominirende linsengrosse weisse Knötchen; an der Concha eine haselnuss-grosse Neubildung, deren microscopischer Bau mit den Rotzneubildungen übereinstimmt. — Die Schleimhaut catarrhalisch, geschwellt, mit gelblichem dickem Schleim bedeckt. In der linken Nasenhöhle auf der Nasenscheidewand strahlige Narben und Knötchen, die weisslich sind. In der Lunge einzelne Knötchen.

Im Blute in geringer Zahl Micrococcen und zweigliederige Kettchen, die glänzend und beweglich sind.

Zweites Versuchsobject. Mit Nasenausfluß des Pferdes Nr. I geimpftes in einigen Tagen am Nasenrotz erkranktes Pferd.

Am 19. November 1881 wurde einem alten Pferde Nr. II. hiesiger Landrace Nasenausfluß des rotzverdächtigen Pferdes Nr. I auf folgende Weise in die rechte Nasenhöhle applicirt. Mit dem Finger rieb ich den unteren Theil der Nasenscheidewand roth, kratzte auf zwei Stellen die Epithelschicht ab, so daß einige Tropfen Blutes herausfickerten und brachte nun den Nasenausfluß des rotzverdächtigen Pferdes Nr. I auf die wundgeriebene Stelle. Letzteres wiederholte ich am Abend noch ein Mal. Am dritten Tage trat an der Impfstelle eine starke entzündliche Eruption ein und am vierten Tage hatte sich eine bläschenähnliche Abhebung der Schleimhaut des Septum narium gebildet, deren Umgebung catarrhalisch war. In den darauffolgenden Tagen stellte sich Nasenausfluß ein, es bildeten sich Geschwüre und der entzündliche Proceß zog sich nach oben. Nach 3 Wochen schwellen die Kehlgedrüsen an. Im weiteren Verlauf bildete sich Oedem an den hinteren Extremitäten, und Wurmgeschwüre traten daselbst auf. Bis zum Ende bestand ein spärlicher aber consistenter Nasenausfluß. Die Geschwüre waren mit dickem Eiter bedeckt. Das Pferd wurde am 21. December 1881 durch den Nackenstich getödtet.

Section. Cadaver abgemagert. Auf der Haut der Extremitäten Geschwüre, stellenweise mit Schorfen bedeckt. Die Lymphgefäße und Lymphdrüsen geschwellt. Das Septum narium ist bis auf zwei Drittel ganz durchlöchert. Am oberen Theile des Septum narium sind Knötchen und Geschwüre mit zerfressenen Rändern. Im Nasenschleim Micrococcen und mehrgliederige Kettchen, große körnige Zellen, Epithelzellen. Im Blute wenig Micrococcen.

Kaninchen.

I. Gruppe.

Verfuch I. Den 17. November 1881. Subcutane Impfung eines Kaninchens an beiden Ohren mit dickem Nafenausfluß des Pferdes Nr. I.

Temperatur vor der Impfung 39,3

„ am 18. November 40,5

„ „ 19. „ 40,7

„ „ 20. „ 41,2

„ „ 21. „ 40

Am zweiten Tage zeigte sich eine entzündliche Reaction an den Impfstellen; die Umgebung der Impfwunden stark geröthet; in den nächsten Tagen ergriff die Röthung das ganze Ohr; die Impfwunden selbst zeigten sehr geringe eiterige Infiltrationen. Der Tod erfolgte in der Nacht vom 21—22. November.

Section d. 23. November. Befund: Cadaver abgemagert; die Umgebungen der subcutanen Applicationsstellen stark geröthet; die Ohren verdickt, ödematös. An der Applicationsstelle des rechten Ohrs befindet sich eingedickter Eiter, der sich in Form eines Keiles ungefähr $\frac{1}{2}$ Cent. weit dem Grunde der Ohrmuschel zu fortpflanzt. Nasenschleimhaut hyperämisch, ebenso die Trachealschleimhaut; Magendarmschleimhaut grau-braun. In der Leber Pforospermien. Gehirnhäute hyperämisch Im Blutserum der Ohren Kugel- und Kettenbakterien. Im Blute kugelförmige und zwei bis dreigliederige kettenförmige Bakterien. Fig. III und Fig. IV.

Verfuch II. Am 17. November. Subcutane Impfung eines Kaninchens am rechten Ohr mit dicklichem Nafenausfluß des Pferdes Nr. I.

In den nächsten zwei Tagen stellte sich eine leichte Röthung in der Umgebung der Impfstelle ein; die Röthung hielt längere Zeit an; später bedeckte sich die Impfwunde mit einem Schorf,

der fest an dem Knorpel saß und erst Ende December 1881 abfiel, sie hinterließ eine strahlige Narbe und wulstige Verdickung.

Am 4. Tage nach der Impfung wurde mit Wasser verdünnter Nasenausfluß vom Pferde Nr. I dem Kaninchen in die Nasenhöhle gespritzt, es trat kein Nasenausfluß ein. Am 27. November wurde wieder Nasenschleim vom Pferde Nr. I genommen und dem Kaninchen in die Nasenhöhle gespritzt; es trat keine Reaction ein. Die Temperatur war beständig 39; Schwankungen nur um Zehntelgrade. Das Thier blieb am Leben.

Versuch III. Am 19. November. Ein Kaninchen subcutan geimpft am rechten Ohr mit durch Wasser verdünntem dicken Nasenschleim des Pferdes Nr. I.

Es fand eine leichte entzündliche Eruption statt, welche bald verging; die Impfstelle bedeckte sich mit einem Schorf, der bald abfiel und eine Narbe nachließ. Temperatur blieb normal.

Versuch IV. Den 19. November. Subcutane Impfung eines Kaninchens am linken Ohr und an der rechten Flanke mit durch Wasser verdünntem Nasenausfluß des Pferdes Nr. I.

Sehr geringe Entzündung und Röthung des Ohrs und der Impfstelle an der Flanke; die Impfwunden bedeckten sich bald mit Schorfen, welche bald abfielen und eine geringe Narbe hinterließen. Das Thier blieb am Leben.

Versuch V. Den 27. December. Ein Kaninchen wurde subcutan geimpft mit Nasenausfluß des Pferdes Nr. I.

Impfstelle am linken Ohr und an der linken Flanke.

Temperatur vor der Impfung 39,3

„ am 28. November 39,9

„ „ 29. „ 40,7

„ „ 30. „ 40,5

„ „ 1. December 40,4

„ „ 2. „ 40,3

„ „ 3. „ 40,6

Temperatur am 4. December 40,7

„	„	5.	„	39,5
„	„	6.	„	40,0
„	„	7.	„	40,2
„	„	8.	„	40,1
„	„	9.	„	38,0

Am zweiten Tage war die Umgebung der Impfwunde am Ohr und an der Flanke geröthet. Am 3. und 4. Tage am Ohr eine seröse Ausschwitzung und das Ohr stark geröthet. Die Umgebung der Impfwunde in der Flanke ist etwas geröthet. Am 5. Tage hat sich am Ohr in der Impfwunde Eiter angesammelt. Es trat Durchfall ein, welcher bis zum Ende des Thieres bestand. Den 10. December das Kaninchen todt vorgefunden. Section den 10. December. Cadaver abgemagert; After befudelt mit Excrementen. Das linke Ohr stark verdickt, ödematös, beim Einschneiden floss eine seröse röthliche Flüssigkeit heraus. In der Wunde etwas Eiter. In der Flanke befindet sich eine Narbe. Lunge pigmentirt, stellenweise grau-roth-braun; Trachealschleimhaut hyperämisch. Microscopische Untersuchung: Im Blutserum des Ohrs Kugel- und Kettenbakterien. Im Blute sehr wenige Micrococcen und Kettchen. Fig. III. u. IV.

Versuch VI. Am 2. December. Subcutane Impfung eines Kaninchens an beiden Ohren (an jedem Ohr auf drei Stellen) mit durch Wasser verdünntem, dicken, eiterigen Ausfluss aus der Nasenhöhle des Pferdes Nr. I. In die Nasenhöhle des Kaninchens wurde etwas von demselben Nasenausfluss gespritzt. Microscop. Untersuchung: der Nasenausfluss enthielt Micrococcen in Menge.

Temperatur vor der Impfung 40,0.

Den 3. December Ohren geröthet.

Temp. 40,5.

Am 4. stellte sich ein klarer Ausfluss aus der Nase ein. Die Impfwunden sind in der Umgebungsfläche trüb gelblich-citrig infiltrirt;

Temp. 40,3.

Den 5. December. An den Impfstellen hat die eiterige Infiltration weiter um sich gegriffen, dem Aussehen nach sind die Impfwunden gelblichweiß. Ohren ödematös. Nase rein.

Temp. 39,3.

Den 6. December. Die subcutanen Impfstellen sind etwas eingetrocknet und die Eiterungen haben nicht weiter um sich gegriffen. Ohren geröthet, Nase rein.

Temp. 39,8.

Am 7 Dec. sind die Impfwunden noch mehr eingetrocknet; Ohren weniger geröthet, aber ödematös.

Temp. 39,6.

Den 8. Dec. Am rechten Ohr an der Impfwunde hat die eiterige Infiltration weiter um sich gegriffen; am linken Ohr noch mehr eingetrocknet.

Temp. 39,5.

Den 9. Dec. Die subcutanen Impfwunden sind mit gelbbraunlichen Schorfen bedeckt, die Nase ist rein.

Temp. 39,2.

Am 10. und 11. Dec. Durch eiterige Infiltrationen haben sich die subcutanen Impfstellen am rechten Ohr etwas vergrößert.

Temp. d. 10. Dec. 41,0.

Temp. d. 11. Dec. 39,7.

Vom 12. — 15. Dec. trockneten die Impfwunden immer mehr ein; am 15. war das linke Ohr stark geröthet und die Röthung zog sich bis zum Ohrgrunde hin.

Temp. d. 12. Dec. 39,3

„ „ 13. „ 39,4

„ „ 14. „ 39,4

„ „ 15. „ 39,5.

Den 16. Dec. Linkes Ohr geröthet; vom 17. bis 21. Dec. ließ die Röthung nach, das Oedem nahm ab. Vom 21. Dec. bis zum 2 Januar 1882 verheilten die Impfwunden; die Schorfe fielen ab und hinterließen merkliche Narben. Temp. vom 16. bis 21.

Dec. 39; Schwankungen um Zehntelgrade. Das Kaninchen blieb gesund. Am 21. Februar 1882 waren außer den Narben, keine Veränderungen zu sehen.

Verfuch VII. Den 2. Dec. Subcutane Impfung eines Kaninchens an beiden Ohren mit schleimig-eiterigen Nasenausfluß des Pferdes Nr. I. Die schleimig-eiterige Masse wurde mit Wasser verdünnt. Von derselben Flüssigkeit wurde etwas in die Nasenhöhle gespritzt und subcutan in die linke Flanke injicirt. Es wurden auch Scarificationen an den Ohren gemacht und auf dieselben von der Flüssigkeit applicirt.

Temperatur vor der Impf. 39,5.

Am 3ten Tage nach der Impfung waren die Ohren und die Umgebung der Impfwunde in der Flanke stark geröthet.

Temp. am 3. Dec. 40,7

„ „ 4. „ 40,2

Den 5ten December Ohren weniger entzündet, ödematös; Nase rein.

Temp. 35,5.

Am 6. Decemb. Ohren ein wenig geröthet; in der Umgebung der Injectionsstellen in den subcutanen Impfwunden hat sich etwas Eiter angesammelt; die scarificirten Stellen sind verheilt; Nase ist rein; das Thier athmet beschleunigt und ist traurig.

Temp. 35,0.

Abends todt vorgefunden.

Section den 7. December. Cadaver mäfsig abgemagert; am rechten Ohr ist die subcutane Impfstelle mit milchfarbigem Eiter infiltrirt; in der Umgebung der Impfstelle unter der Haut mäfsig eingedickter Eiter, das ganze Ohr ödematös. Am linken Ohr haben beide subcutanen Impfstellen ein graugelbliches Aussehen; unter der Epidermis an diesen Stellen eingedickter Eiter; ihre Umgebung ist geröthet. An den scarificirten Flächen ist nur eine kleine Stelle vorhanden, in welcher sich eingedickter gelblich

weißer Eiter befindet. In der linken Flanke sind an den Impfstellen gelbliche knötchenförmige Erhöhungen zu sehen, in denen ebenfalls eingedickter gelblich-trüber Eiter sich befindet. After mit Koth befudelt. Nafenscheidewand hyperämisch, Trachealschleimhaut geröthet; Lungen blafs anämisch. Magen-Darm-Schleimhaut blafs grau-weißlich. Leber dunkel-braunroth, stellenweise weiße Flecke. Nieren blafs bräunlichroth. Gehirnhäute hyperämisch. — Microscop. Untersuchung: In der eingedickten weißgraulichen Masse Eiterkörperchen. In der serösen Flüssigkeit der Ohren zahlreiche Micrococcen, die theils zu Kettchen aneinander gereiht; ebenso im Blute Micrococcen und Kettchen (Fig. III u. IV.) In der Leber Pforospermien-schläuche.

Versuch VIII. Den 21. December. Subcutane Impfung eines Kaninchens an beiden Ohren mit Geschwürssecret und Nasenschleim vom Pferde Nr. I. (Geschwürssecret mit Wasser verdünnt.) Die Flüssigkeit enthielt bei der microscop. Untersuchung zweigliederige bewegliche Kettchen und isolirte Micrococcen.

Am zweiten Tage stark entzündliche Eruption; Eiteransammlung in den Impfstellen.

Temp. d. 22. December 40,8.

Am 3. Tage wurde der Eiter entfernt; die Umgebung der Impfstellen stark geröthet.

Temp. d. 23. Dec. 40,8

„ „ 24. „ 40,6

„ „ 25. „ 41,2.

Am 26. Dec. Todt.

Section am 27. December. An den Impfstellen eingedickter Eiter; die Umgebung geröthet. Lunge gefleckt, stellenweise dunkelbraunroth, stellenweise gelblich-roth. Leber stellenweise lehmfarbig, stellenweise grau-weißlich. Magen- und Darm-Schleimhaut catarrhalisch, verdickt. Im Blut massenhaft zweigliederige Kettchen, ähnlich den Micrococcen der Impfflüssigkeit. Im Eiter der Impfstellen zweigliederige bewegliche Kettchen. Nierencpithel im Zer-

fall begriffen, Fetttröpfchen enthaltend. Leberzellen verfettet. Im Leberblute massenhaft Micrococcen.

Verfuch IX. Den 21. December. Subcutane Impfung eines Kaninchens an beiden Ohren mit Geschwürssecret und Nasenausfluß des Pferdes Nr II. In der Flüssigkeit zweigliederige, bewegliche Kettchen und isolirte Micrococcen.

Am 2. Tage Ohren-stark entzündet.

Temp. am 22. December 40,3.

Am 3. Tage. In den subcutanen Impfstellen hat sich Eiter angefammet; die Umgebung ist stark geröthet. Die Impfwunden wurden gespalten und der Eiter entleert.

Temp. den 23. December 41,6

„ „ 24. „ 39,0

Den 25. Dec. todt vorgefunden. Section d. 26. December.

An den Impfstellen der Ohren befindet sich eingedickter Eiter. Die Impfstellen bilden offene Wunden. Lunge pigmentirt. In den Nierenkanälchen Detritus; Epithelzellen verfettet. Im Blute sehr wenige zweigliederige bewegliche Kettchen. Im Blutserum und Eiter der Ohren massenhaft bewegl. zweigliederige Kettchen. Fig. III u. IV.

II. Gruppe.

Verfuch I. 27. November. An beiden Ohren eines Kaninchens wurden Scarificationen gemacht und Nasenausfluß des Pferdes Nr. I darauf applicirt.

Am 2. Tage trat an beiden Impfstellen eine entzündliche Eruption ein, die Impfwunden bedeckten sich nach einigen Tagen mit einem braunen Schorf; der Schorf am rechten Ohr fiel bald ab, eine kleine Narbe hinterlassend; dagegen faß der Schorf auf der Impfwunde des linken Ohrs drei Wochen lang, fiel darauf zusammen mit einem Stück der Ohrmuschel ab und hinterließ ein rundes Loch, welches einen glatten Rand besaß, der nur an einer Stelle etwas angegriffen war. Das Kaninchen blieb gesund.

Verfuch II. Den 2. December. Beide Ohren eines Kaninchens wurden der Länge nach scarificirt, (die Schnitte ungefähr 2 Cm. lang, 10 an der Zahl) darauf Nasenausfluß des Pferdes Nr. I applicirt (Nasenausfluß mit Waffer verdünnt). Von derselben Flüssigkeit wurde ihm subcutan in die rechte Flanke injicirt und in die Nasenhöhle gespritzt.

Temperatur vor der Impfung 39,7.

Am 2. Tage. Ohren stark geröthet, die Umgebung der Impfwunde in der Flanke wenig geröthet.

Temp. d. 3. Dec. 41,1.

Am 3. Tage. In den Einschnitten der Ohren gelbliches eingetrocknetes Serum; Nase ist rein; es hat sich Durchfall eingestellt.

Temp. d. 4. Dec. 41,2.

Am 4. Tage Ohren stark geröthet; in den Einschnitten etwas Eiter; gelblicher Nasenausfluß. Durchfall vorhanden.

Temp. d. 5. Dec. 40,8

„ „ 6. „ 38,8.

Am 6. Tage früh Morgens wurde das Thier todt vorgefunden. Section den 7. December. Cadaver abgemagert; rechtes Ohr hyperämisch; in den strichförmigen Einschnitten befindet sich Eiter, welcher eingedickt ist und ein gelblichweißes Aussehen hat. Am linken Ohr befindet sich stellenweise (der Länge nach) in den Einschnitten gelblichweißser eingedickter Eiter; die Umgebung der Impfstellen stark geröthet; Nase mit gelblichem Schleim befudelt. In der rechten Flanke sieht man auf zwei Stellen, gelbweißliche hanfkorngroße Knötchen, die gerade an den Impfstellen sich befinden, beim Durchschneiden erweisen diese sich, als eine eingedickte gelbweißliche Masse, die unter dem Microscop Eiterkörperchen aufweist. Die Umgebung der Impfstelle ist hyperämisch. After mit dünnflüssigen Excrementen befudelt. Magen- und Darm Schleimhaut blaß graubraun; Magen gefüllt mit trocknen Futtermassen. Der rechte Lungenflügel bis

$\frac{3}{4}$ gelblich grauroth, hepatisirt. Linker Lungenflügel hyperämisch. Trachealschleimhaut blafs, stellenweise geröthet; Nasenschleimhaut hyperämisch, auf einer Stelle des Septum narium eine undeutliche Auflagerung. Im Blute der Ohren und im Eiter contractile Micrococcen und zweigliederige Ketten. Im Leberblute ebensolche Micrococcen und Ketten. Fig. III u. Fig. VI.

Verfuch III. Den 2. Dec. Beide Ohren eines Kaninchens wurden der Länge nach scarificirt (die Schnitte ungefähr 2 Cm. lang, 10 an der Zahl). Auf dieselben wurde Nasenausfluß des Pferdes Nr. I applicirt (Nasenschleim mit Wasser verdünnt). Von derselben Flüssigkeit wurde dem Kaninchen in die Nasenhöhle gespritzt.

Temperatur vor der Application 39,0.

Temp. am 3. Dec. 39,6

"	"	4.	"	40,8
"	"	5.	"	39,2
"	"	6.	"	40,3
"	"	7.	"	40,0
"	"	8.	"	39,4
"	"	9.	"	39,0
"	"	10.	"	40,2
"	"	11.	"	39,4
"	"	12.	"	39,5
"	"	13.	"	39,4
"	"	14.	"	39,2
"	"	15.	"	39,5
"	"	16.	"	40,0
"	"	17.	"	40,0
"	"	18.	"	40,0
"	"	19.	"	39,2.

Vom 20. bis zum 11. Januar 1882, Temperatur 39; Schwankungen um Zehntelgrade.

Am 2. Tage nach der Impfung waren die Ohren stark geröthet; die Einschnitte mit serösen gelben Auschwitzungen bedeckt; Nase rein. Am 4 Tage nach der Impfung hat sich in den Einschnitten eine seröse Flüssigkeit angesammelt, stellenweise eingetrockneter Eiter. Ohren sind ödematös. Nase rein. Am 7. Tage. Die Eiterinfiltration weiter verbreitet. Am 8. Tage Ohren stark geröthet, der Eiter in den Einschnitten eingetrocknet und die Wunden mit gelblichen Schorfen bedeckt. Vom 13. Dec. bis zum 11. Januar 1882 verheilten die Einschnitte allmählig. Um diese Zeit stellte sich Nasenausfluß ein; das Kaninchen war sonst munter, athmete aber schnarchend.

Versuch IV. 2. December. Beide Ohren eines Kaninchens wurden der Länge nach scarificirt (die Schnitte ungefähr 2 Centim. lang, 10 an der Zahl) und Nasenausfluß des Pferdes Nr. I auf dieselbe applicirt (Nasenschleim mit Wasser verdünnt.) Mit derselben Flüssigkeit wurde das Kaninchen mittelst einer Impfnadel subcutan in die rechte Flanke geimpft. Auch in die Nasenhöhle wurde dem Thiere von derselben Flüssigkeit gespritzt.

Temperatur vor der Application 39,2.

Am 2. Tage — Ohren stark entzündet; Nase rein. In der Flanke keine entzündliche Reaction.

Temperatur am 3. Decemb. 41,0.

„ „ 4. „ 40,9.

Am 4. Tage Ohren ödematös, in den Einschnitten stellenweise etwas Eiter angesammelt, stellenweise eingetrocknetes gelbliches Serum.

Temp. am 5. Dec. 41,3.

Am 5. Tage war das Thier sehr matt; Nase unrein; Durchfall hat sich eingestellt. Es athmet beschleunigt und angestrengt. In der Flanke die Umgebung der Impfstelle geröthet.

Temp. d. 6. Dec. 40,7.

„ „ 7. Dec. am Morgen 33,5.

Um Mittag ist das Thier gefallen.

Section. Cadaver mäfsig abgemagert; in den Einschnitten der Ohren eingetrocknetes seröses Exudat: stellenweise ein wenig Eiter; Ohren hyperämisch besonders in der Umgebung der Einschnitte. In der Flanke hanfkorngröfse gelbweisse Knötchen; von dem einen geht als Fortsetzung nach hinten und oben ein mit trübgelblicher eingedickter Masse gefüllter Strang, der ungefähr $\frac{1}{4}$ Centim. breit und $\frac{1}{2}$ Cent. lang; beim Durchschneiden stellt derselbe eine dickliche, käfige Masse dar, die unter dem Microscop Eiterkörperchen aufweist. Nasenscheidewand hyperämisch. Im Blute Micrococcen, die theils zu Ketten aneinander gereiht, aber weniger als im Blutserum und Eiter der Impfwunden. (Fig. III und Fig. IV.)

Versuch V. Den 21. Decemb. Beide Ohren eines Kaninchens wurden scarificirt und mit Wasser verdünntes colirtes Geschwürssecret des Pferdes Nr. II, darauf applicirt.

Am zweiten Tage athmete das Thier beschleunigt; die Ohren stark geröthet. Am 3. Tage: Die Ränder der Einschnitte stellenweise, schwarzbraun, brandig. Die Ohren verdickt, ödematös.

Temperatur vor der Impfung 39,5

„ den 22. Decemb. 41,0

„ „ 23. „ 31,2

Abends d. 23. Dec. todt vorgefunden. Section den 24. Decemb. Cadaver mäfsig abgemagert; Ohren verdickt; beim Einschnneiden fließt ein röthliches seröses Transsudat heraus. In den Impfstellen Eiter und seröses Transsudat; stellenweise sind die Ränder eingetrocknet, stellenweise dunkelgrau braun. Magen-Darmschleimhaut blafsgrau. In der Leber Pforospermien. Im Blutserum der Ohren Micrococcen. Im Blute sehr wenige zweigliederige bewegliche Kettchen. (Fig. III u. IV). Nierenepithel zerfallen in den Kanälchen Detritus und Fetttröpfchen.

Versuch VI. Den 21. December. Beide Ohren eines Kaninchens wurden scarificirt und Geschwürssecret des Pferdes Nr. II darauf applicirt.

Am zweiten Tage starke Röthung der Ohren. Die Ränder der Einschnitte serös infiltrirt. Am 3. Tage hat sich in den Einschnitten etwas Eiter angefammelt.

Temperatur d. 22. December 41,8

„ „ 23. „ 41,3

„ „ 24. „ 37,8

Den 25. Dec. todt vorgefunden. Section den 25. Dec. Cadaver mäfsig abgemagert. Am rechten Ohr in den Einschnitten flüssiger Eiter und stellenweise eingetrocknetes Blutserum; stellenweise sind die Wundränder dunkelbraunroth; das r. Ohr ist verdickt, ödematös. Das linke Ohr ist stark verdickt. In den Einschnitten Blutserum und eingedickter Eiter; die Wundränder stellenweise brandig. Am Bauche fulzige Infiltrationen. Lunge pigmentirt. Im Blute Micrococcen; im Blutserum der Ohren und in der fulzigen Flüssigkeit zweigliederige bewegliche Kettchen. (Fig. III u. Fig. IV). Nierenepithel zerfallen, Kanälchen gefüllt mit Fetttröpfchen.

Gruppe III.

Versuch I. Den 21. December. Einem Kaninchen wurde Geschwürssecret des Pferdes Nr. I in die Nasenhöhle gespritzt.

Am 8. Tage stellte sich Nasenausfluss ein, die Nasenränder mit gelblichen Schleim belegt. Der Nasenausfluss bestand bis zum Ende des Thieres.

Temperatur vom 21. December bis zum 3. Januar 1882 39; Schwankungen um Zehntelgrade.

Temperatur den 3. Januar 40,9

„ „ 4. „ 40,4

„ „ 6. „ 39,7

„ „ 7. „ 40,6

„ „ 8. „ 40,5

„ „ 11. „ 38,5

Den 12. December todt vorgefunden. Section. Cadaver abgemagert. Haare struppig. Nasenränder mit eingetrocknetem

Eiter und Schleim belegt. In der linken Nasenhöhle eingedickter Eiter. Septum narium perforirt. Das Nasenbein ist an einer Stelle aufgetrieben, mürbe, mit einer Ufur. In diesem aufgetriebenen Theile befindet sich eingedickter Eiter in Form eines käfigen Knötchens. Lunge unverändert. Microscop. Untersuchung: Eiterkörperchen und zu zweigliederigen Kettchen vereinigte Micrococcen.

Verfuch II. Den 21. December. Einem Kaninchen wurde (mit Wasser verdünntes) Geschwürssecret der Pferde Nr. I u. Nr. II in die Nasenhöhle gespritzt.

Am 10. Tage stellte sich Nasenausfluss ein; die Nasenränder waren mit gelblichem Schleim bedeckt. Nase schwoll äußerlich an. Nasenausfluss bestand bis zum Ende des Thieres.

Section d. 2. Februar. Cadaver abgemagert. Haar struppig. Nasenöffnungen mit eingetrocknetem Eiter und Schleim belegt. After mit dünnflüssigen Excrementen befudelt. In der Nasenhöhle eingedickter Eiter; das Nasenbein aufgetrieben und stellenweise Substanzverluste. Lunge hyperämisch, stellenweise gelblich grau-roth. Am Ohr ein Substanzverlust mit haarlosem Rande. Leber stellenweise graubraun. Microscop. Untersuchung weist im eingedickten Eiter der Nasenhöhle Micrococcen und Eiterkörperchen auf.

IV. Gruppe.

Verfuch I. Den 21. December. Einem Kaninchen wurde Geschwürssecret und Nasenschleim der Pferde Nr. I und Nr. II (mit Wasser verdünnt und colirt) auf eine von der Epidermis befreite Stelle an dem rechten und linken Ohr applicirt. Die excoriirten Flächen waren am 2. Tage ganz feucht und rundherum stark geröthet; am 3. Tage bildete sich an einer kleinen Stelle am rechten Ohr ein Substanzverlust, so dass die Ohrmuschel wie angefressen ausah. Am 4. Tage rund um die excoriirten Stellen starke Röthung; die Wundflächen feucht und mit etwas Eiter bedeckt. Am 5. Tage hat die excoriirte Fläche des rechten

Ohrs an Umfang bedeutend zugenommen und ist feucht. Am 7. Tage, der Eiter auf den excoriirten Flächen eingetrocknet.

Am 10. Tage, das r. Ohr ödematös; die excoriirte Fläche am linken Ohr mit Feuchtigkeit bedeckt,

Temp. d. 22. December 39,8

„ „ 23. „ 39,8

„ „ 24. „ 39,6

2 „ 25. „ 39,8

„ „ 26. „ 40,6

„ „ 27. „ 40,3

„ „ 28. „ 40,5

„ „ 29. „ 40,0

„ „ 30. „ 40,1

„ „ 31. „ 40,7

„ „ 1. Januar 40,6

„ „ 2. „ 39,3

Am 3. Januar verendete das Thier. Section erwies: Beide Ohren verdickt, ödematös; die Impfflächen mit gelblichem eingedicktem Eiter bedeckt; die Umgebung derselben geröthet. Nasenöffnungen mit gelblichem, Nasenschleimhaut mit weißlich grauem Schleim bedeckt. Gehirnhäute hyperämisch. Microscop. Untersuchung: Im Blute sind die farblosen Blutkörperchen mit massenhaften glänzenden beweglichen Micrococcen besetzt; die Menge der farblosen Blutkörperchen vermehrt; die rothen Blutkörperchen stechapfelförmig. Im Blutserum zweigliederige Kettchen. Im Wundflächensecret zweigliederige bewegliche Kettchen. Der Grund der Geschwüre enthält Fetttröpfchen. Nierenkanälchen gefüllt mit Detritus und Fetttröpfchen. Epithel zerfallen.

Versuch II. Den 21. December. Einem Kaninchen wurde Geschwürssecret und Nasenschleim der Pferde Nr. I und Nr. II (mit Wasser verdünnt und colirt) auf eine von der Epidermis befreite Stelle am linken und rechten Ohr applicirt.

Am 2. Tage war die excorierte Stelle feucht, mit Blutserum bedeckt, in der Umgebung stark geröthet. Am 3. Tage hat sich auf den excoriirten Flächen Eiter angefammelt und ein Substanz verlust des Ohrknorpels eingestellt.

Temperatur d. 22. December 39,5

„ „ 23. „ 41,0

„ „ 24. „ 39,7

„ „ 25. „ 41,0

Am 26. December das Kaninchen todt vorgefunden. Section den 27. Am rechten Ohr ist die excorierte Fläche an einer Stelle vertieft und mit Eiter bedeckt; der übrige Theil des Ohrs geröthet und feucht. Am linken Ohr ist die Umgebung der excoriirten Stelle stark geröthet, die exc. Fläche mit Eiter bedeckt. Nasenlöcher mit gelblichem Schleim befudelt. Im Eiter der Wundflächen zweigliedrige Kettchen. Im Blute zweigliedrige bewegliche Ketten. (Fig. III und IV). Nierenepithel zerfallen; Kanälchen mit Detritus gefüllt und einzelne Fetttröpfchen enthaltend.

Versuch III. Den 25. December. An einem Ohr eines Kaninchens wurden Einschnitte der Länge nach gemacht; am andern Ohr wurde ein rundes Stück Epidermis ausge schnitten, ungefähr 1 Cent. im Diamet. Auf diesen Wunden wurde Blutserum und Eiter aus dem Ohr des am 25. December unter Versuch IX, I. Gruppe verzeichneten, verendeten Kaninchens applicirt.

Am 2. Tage war das rechte Ohr stark entzündet; die excorierte Stelle des linken Ohrs war mit eingetrocknetem Eiter bedeckt. Am 3. Tage hat sich in den Einschnitten des r. Ohrs ein wenig Eiter angefammelt.

Temperatur vor der Impfung 38,7

„ d. 26. December 40,5

„ „ 27. „ 40,0

„ „ 28. „ 40,9

Am 29. December das Thier todt vorgefunden. Section den 30. Dec. Das r. Ohr verdickt, in den Einschnitten deselben

eingetrocknetes Blutserum und Eiter. Die excorierte Impfstelle ist papierdünn, vollständig durchsichtig. Lunge pigmentirt; weisgelbliche verdickte Knötchen auf einzelnen Stellen derselben. Nasenschleimhaut geröthet. Im Herzblute und Blutserum der Ohren zweigliederige bewegl. Kettchen. (Fig. III und IV.)

Verfuch IV. Den 4. Dec. An beiden Ohren eines Kaninchens wurden rundliche Epidermischichten ausgeschnitten und darauf verdünnter Nasenausfluß des Pferdes Nr. I applicirt.

Am 2. Tage waren die Ohren entzündet; die Wundflächen feucht. Am 5. Tage: die Röthung der Ohren vergangen; die excoriirten Wundflächen mit einem bräunlichen Schorfe bedeckt, welcher nach einigen Tagen abfiel, eine kleine Narbe hinterlassend.

Temp. vor der Impfung 39,5

„ d. 5. December 39,8

„ „ 6. „ 40,5

„ „ 7. „ 40,3

„ „ 8. „ 40,8

„ „ 9. „ 40,4

„ „ 10. „ 40,5

„ „ 11. „ 40,1

„ „ 12. „ 40,2

„ „ 13. „ 39,5

Das Kaninchen blieb gesund.

Verfuch V. Den 4. December. (Vergleichsweise mit Verfuch IV.)

An beiden Ohren eines Kaninchens wurden rundliche Epidermischichten ausgeschnitten. Am 2. Tage war die Umgebung der Wundflächen etwas geröthet; die excoriirten Flächen feucht mit Blutserum bedeckt. In den folgenden Tagen trockneten die Wundflächen und bedeckten sich mit einem Schorf, der nach einigen Tagen mit Hinterlassung kleiner Narben abfiel.

Temp. vor der Operation 39,0

„ den 5. December 38,5

Temp. den	6. December	39,6
„	„ 7.	39,0
„	„ 8.	39,2
„	„ 9.	39,0
„	„ 10.	39,0 etc.

Aus dieser Versuchreihe ergibt sich, daß die Rotzimpfungen bei 5 Kaninchen positive, bei 10 Kaninchen zweifelhaft, und bei 6 Kaninchen negative Resultate ergeben haben

Versuche mit Hunden.

Verfuch I. Am 23. November 1 Uhr wurde einem Jahr alten Hunde Blutserum aus dem ödematösen Ohrlappen und die dickliche Eitermasse, die sich in Form eines Keiles fortgepflanzt hatte, vom unter Nr. I, Gruppe I verzeichneten Kaninchen, subcutan vermittelst eines Einstichs in die rechte Flankengegend gebracht; außerdem wurden Scarificationen am linken Ohr gemacht und Blutserum vom obengenannten Kaninchen, eingepfht.

Nach sieben Tagen stellte sich an der Impfstelle der rechten Flanke eine Turgescenz ein; im Verlaufe der nächstfolgenden Tage bildeten sich zwei gefüllte Abcesse, die ungefähr 1 Zoll von einander entfernt, aufbrachen; die dadurch entstandenen nicht tiefen runden Geschwüre mit aufgeworfenen Rändern nahmen an Umfang immer mehr zu, secernirten dabei sehr wenig Eiter, bis sie ungefähr die Gröfse eines Thalers erreichten, dann bedeckte sich die Geschwürsfläche mit braunen Schorfen, die theilweise abgestofsen wurden. Am Anfang Januar 1882 vernarbten die Geschwüre. Drei Wochen nach der Impfung bildete sich ein drittes Geschwür auf der Schweifrübe, das ebenfalls die Gröfse eines Thalers erreichte und gegen Ende Januar vernarbte. Am Ohr trat keine entzündliche Eruption ein. Das Thier war während der ganzen Zeit munter, zeigte guten Appetit und blieb am Leben.

Verfuch II. Den 7. Dec. Einem 4 Monate alten Hunde wurde Blutserum, welches vermittelst Einschnitte und Auspressen

aus den Ohren des unter Versuch IV, Gruppe I verzeichneten und am 7. December gefallenen Kaninchens entnommen, in eine Wunde der rechten Flanke gebracht. Es wurde so lange gewartet, bis das Blutserum theils reforbirt, theils eingetrocknet war.

Temperatur vor der Impfung 39,6.

Temp. am 8. Dec. 39,2

" " 9. " 39,0

" " 10. " 38,8

" " 11. " 38,6

" " 12. " 39,0

" " 13. " 39,0

" " 14. " 38,2

" " 15. " 38,5

" " 16. " 38,2

" " 17. " 40,0

" " 18. " 39,4

" " 19. " 40,0

" " 20. " 40,0

" " 21. " 39,1

" " 22. " 39,4.

Temperaturaufnahmen vom 23. December bis zum 1. Januar erwiesen 39; Schwankungen um Zehntelgrade.

Temp. d. 1. Januar 40,1

" " 2. " 49,0

" " 3. " 38,0.

Den 4. December Tod. Section: Cadaver abgemagert; Impfstelle vernarbt. Auf der linken inneren Fläche des Schenkels befinden sich runde umschriebene Geschwüre, theilweise mit missfarbigem Eiter, theilweise mit Schorfen bedeckt. Leber stellenweise lehmfarbig; stellenweise dunkelbraun; auf der Oberfläche kleine grauweisliche Punkte. Nierenoberfläche läßt weisse Streifen durchscheinen; beim Flächenschnitt ist eine keilförmige, weissliche organisirte Substanz zu sehen; die Nieren sind ganz durchzogen von ähnlichen keilförmigen Strängen. Das microscopische Bild stellt stark granulirte Zellen dar mit massenhaften Micrococcen;

Nierenkanälchen gefüllt mit Fetttröpfchen; Epithelzellen zerfallen. In den Leberzellen Fetttröpfchen. Der linke Lungenflügel dunkelbraun; vorderer und mittlerer Lappen hepatisirt. Auf der Schnittfläche tritt eine gelbliche dickliche Flüssigkeit hervor. Die microscopische Untersuchung weist Eiterkörperchen, Fettzellen und zweigliederige contractile, stark glänzende aus Micrococcen bestehende Kettchen, auf. Im Geschwürssecret massenhaft bewegliche zweigliederige Kettchen. Der Grund der Geschwüre ist fettig entartet. In den Gehirnventrikeln seröses farbloses Transsudat.

Versuch III. Den 2. December. Einem 3 Monat alten Hunde wurden Einschnitte an beiden Ohren gemacht und Nasenausfluß des Pferdes Nr. I applicirt. Nasenausfluß mit Wasser verdünnt. Von derselben Flüssigkeit wurde dem Hunde eine Pravatz'sche Spritze voll in die linke Flanke injicirt.

Temperatur vor der Impfung 39,2

„ am 3. December 39,7.

Am 4. December. Die Umgebung der Impfstelle in der Flanke geschwellt und stark geröthet. Umgebung der Impfwunden an den Ohren entzündet.

Temp. d. 4. Dec. 40,2.

Am 5. Dec. In der Flanke an der Impfstelle hat sich ein ulcus rodens gebildet; gleich daneben ist eine zweite Oeffnung entstanden. Die Umgebung der Impfstelle am linken Ohr stark entzündet; in der Wunde eine geringe Eiteransammlung.

Temp. d. 5. Dec. 39,5.

Den 6. Dec. Auf zwei Stellen haben die Oeffnungen in der linken Flanke an Umfang bedeutend zugenommen und stellen ein fressendes Geschwür dar. Am rechten Ohr hat sich auf einer Stelle der Impfwunde ein wenig Eiter angesammelt.

Temp. d. 6. Dec. 39,0.

Den 7. Dec. Die Geschwüre in der linken Flanke sind bedeutend größer; die Geschwürsränder aufgeworfen, blauroth.

Temp. d. 7. Dec. 39,0.

Den 8. Dec. Die Geschwürsflächen in der linken Flanke sind vergrößert und confluiren miteinander. Am linken Ohr hat sich auf zwei Stellen der Impfwunden-Eiter angefammelt.

Temp. d. 8. Dec. 38,8.

Den 9. Dec. Das Geschwür in der linken Flanke ist ungefähr $\frac{1}{4}$ Handteller groß; die Ränder sind callös.

Temp. d. 9. Dec. 39,0

" " 10. " 38,7

" " 11. " 38,6

" " 12. " 39,9.

Den 13. Dec. Es haben sich auf mehreren Stellen des Körpers runde oberflächliche ulcerirende Geschwüre gebildet.

Temp. d. 13. Dec. 39,3

" " 14. " 39,0.

Den 15. Dec. An den Ohren sind die scarificirten Stellen zu umschriebenen einen verkrustenden missfarbigen Eiter secernirenden Geschwüren geworden.

Temp. d. 15. Dec. 39,0

" " 16. " 38,5

" " 17. " 38,9.

In der letzten Zeit lahmt das Thier auf der rechten Hinterextremität. Auf dem Körper haben sich auf mehreren Stellen circumscripte ulcerirende Geschwüre gebildet.

Temp. d. 18. Dec. 38,4

" " 19. " 38,5

" " 20. " 38,5.

Am 21. Dec. Der Hund todt vorgefunden. Section den 21. Dec. Cadaver abgemagert; am linken Ohr auf der Innenfläche der Ohrmuschel an den Impfstellen sind vier groschen-große circumscripte flache Geschwüre; sie befinden sich näher zur Spitze der Ohrmuschel. Die gemachten Einschnitte sind stellenweise verheilt. Am Grunde der äußeren Fläche der Ohrmuschel sieben circumscripte, flache Geschwüre, die secundär entstanden

find. Auf der inneren Fläche des rechten Ohrs, an den Einschnitten, welche stellenweise verheilt sind, befinden sich zwei circumscripte grofchengrofse Geschwüre. - An der äufseren Fläche des rechten Ohrs zwei, auf der Stirn zwei, an der Oberlippe, dem Bug- und Ellenbogengelenk, Rücken und Bauch grofchengrofse circumscripte ulcerirende Geschwüre, die theils mit Schorfen, theils mit mifsfarbigem Eiter bedeckt sind.

In der linken Flanke eine Geschwürsfläche, ungefähr 5 Cent. lang und 6 Cent. breit, mit unregelmäßigen Rändern, stellenweise mit schmutzig braunen trocknen Schorfen, stellenweise feucht und mit braunschwarzen Schorfen bedeckt. Am After eine zwei Zoll breite und 1 Zoll lange Geschwürsfläche, die mit einem Schorf bedeckt ist.

Magenschleimhaut dunkel braun gestreift und gefleckt. Darmschleimhaut catarrhalisch verdickt, mit dunkelbraunrothen Flecken und stellenweisen Blutunterlaufungen. Leber weist auf der Oberfläche weißliche graue Flecke auf. Niere anämisch. Der mittlere Theil des linken Lungenflügels ist dunkelbraunroth, hepatisirt; der rechte mittlere Lungenflügel braunroth, hepatisirt. Im Blute sehr wenige Micrococcen, die zu zwei aneinander gereiht und beweglich sind. Im Geschwürssecret in Menge zweigliederige bewegliche, stark glänzende Kettchen. In den Leberzellen Fetttröpfchen und Eiterkörperchen. Der Geschwürsgrund enthält verfettete Zellen. Nierenkanälchen gefüllt mit Detritus und verfetteten Epithelzellen. Tod durch Metastasen nach den inneren Organen und allgemeinen Rotz.

Versuch IV. Den 3. December. Einem 1 Jahr alten Hunde wurden Einschnitte auf der inneren Fläche beider Ohren gemacht und Nasenausfluß des Pferdes Nr. 1 darauf applicirt. In die rechte Flanke wurde eine Pravazsche Spritze voll mit Wasser verdünnten Nasenausflusses injicirt; in der linken Flanke wurde die Epidermis excoriirt und die Stelle mit demselben Nasenausfluß betupft.

Am 2. Tage nach der Impfung waren die Ohren stark entzündet; am 3. Tage zeigte sich eine starke Schwellung der rechten Flanke, welche am folgenden Tage central gefchwürig zerfiel und eine chocoladen-farbige Jauche entleerte. Die excoriirte Stelle in der linken Flanke war mit eingetrocknetem Blute bedeckt. — Am 5. Tage war das Thier traurig, lahmt auf der rechten Hinterextremität.

Temp. vor der Impfung 39,2

„ am 4. December 40,0

„ „ 5. „ 40,2

„ „ 6. „ 39,6

„ „ 7. „ 40,0

Am 8. Dec. der Hund todt. Section: Cadaver ziemlich wohlgenährt in der linken Flankengegend eine mit rothbraunen Schorfen bedeckte Fläche, die den Umfang eines Groschens hatte. In der r. Flanke. an einer Stelle findet sich eine Oeffnung, an welcher eingetrocknetes Blut klebt; beim Aufschneiden der Haut in der rechten Flanke entleerte sich etwas weniger als ein Bierglas voll einer schmutzig gelb-braunen (chocoladenfarbigen) übelriechenden Jauche. Die Höhle, in welcher sich die Jauche befand, erstreckte sich bis über die Hüfte und bis an den After. Nach dem Herausfließen der Jauche stellte sich eine schmutzig-grau-schwarze Fläche dar, deren Umfang der Breite nach ungefähr 3 Zoll und der Länge nach 5 Zoll betrug. Ohren geröthet, in den Einschnitten stellenweise Eiter. Magen-Darm-Schleimhaut blaß-grau-braun, verdickt und mit einem dicklichen Schleim bedeckt. Leber stellenweise lehmfarbig und auf der Oberfläche unter der Serosa durchscheinende kleine punktförmige weiß-gelbliche Flecke. In den Herzventriceln dickliches theerartiges Blut. Gehirnhäute hyperämisch. In der Jauche Micrococcen und zweigliederige bis siebengliederige Ketten, meist aber zu zwei aneinander gereihte Micrococcen. Im Blutserum der Ohren Micrococcen, meist zu zwei aneinander gereihte Kettchen, die beweglich und glänzend sind. Die rothen Blut-

körperchen stechapfelförmig; die farblosen Blutkörperchen sind ganz mit Micrococcen durchsetzt. Leberzellen verfettet. Im Leberblute Kugel- und Kettenbakterien

Verfuch V. Den 21. December. Einem 2 Monat alten Hündchen wurden Scarificationen auf der inneren Fläche beider Ohren gemacht und Geschwürssecret mit Nasenschleim des Pferdes Nr. I darauf applicirt. (Geschwürssecret und Nasenschleim mit Wasser verdünnt.) In die linke Flanke wurde von derselben Flüssigkeit eine Pravazsche Spritze voll injicirt. Die Flüssigkeit wurde vordem durch Lein colirt.

Temperatur am 22. December 39,5.

„	„	23.	„	39,8.
„	„	24.	„	39,3.
„	„	25.	„	39,7.
„	„	26.	„	39,0.
„	„	27.	„	32,0.

Am 2. Tage wurde der aufgetriebene Theil in der linken Flanke geöffnet; es entleert sich eine gelblich-grüne übelriechende Flüssigkeit, welche mehrgliedrige bewegliche Kettchen enthält. Der Schnitt ist ungefähr ein Centim. lang. Die Höhle wurde mit verdünnter Carbolensäurelösung gereinigt. In den Einschnitten des Ohrs befand sich Blutserum. Am 3. Tage waren die Ohren entzündet; die Ränder der Einschnitte etwas mehr klaffend, stellenweise an derselben eingetrocknetes Blutserum. Die Höhle in der Flanke wurde mit verdünnter Carbolensäurelösung gereinigt. Am 4. Tage confluirten die Ränder der Einschnitte und bildeten eine offene ulcerirende Geschwürsfläche. Die äußeren Ohrränder stellenweise angeschwollen und blauroth, beim Oeffnen derselben entleert sich eine bräunliche dickliche Flüssigkeit, welche Eiterkörperchen und zweigliedrige Kettchen enthielt. Diese beulenartigen Anschwellungen der Ohren zerfielen central und stellten circumscripte Geschwüre dar, die weiter um sich griffen. Am 5. Tage klaffen die Ränder der Wunde in d. l. Flanke mehr auseinander;

die Höhle wurde mit verdünnter Carbolsäurelösung gereinigt. Auf der Haut des Rumpfes zeigten sich mehrere geröthete Flecke. Am linken Ohr sind die Einschnitte zu einer runden Geschwürsfläche geworden, ausserdem bildeten sich mehrere Geschwüre an der inneren Fläche des Ohrs. Die Ränder der Ohren blauroth. Am 6. Tage hat sich secundär am Grunde des r. Ohrs ein circumscriptes Ulcus rodens gebildet. Das Thier ist sehr schwach; die runden Geschwürsflächen haben sich vergrößert, Ohren sehr verdickt.

Es erfolgte in der Nacht vom 27. auf 28. December der Tod des Thieres. Section: Cadaver abgemagert; Ohren stark verdickt. Auf der inneren Fläche circumscripte Geschwüre, mit dunkelbraunrothen Rändern. Auf der äusseren Fläche des r. Ohrs am Grunde und am linken Ohr an der Impfstelle circumscripte ulcerirende Geschwüre. An dem inneren Rande des l. Ohrs ein Abscess, nach dessen Durchschneidung sich eine chocoladenfarbige Flüssigkeit entleerte. An der Brust ein grofchengrofses circumscriptes Geschwür, und neben demselben noch einige $\frac{1}{2}$ Centim. grofse circumscripte ulcerirende Geschwüre. Am Bauch und rechten Hinterschenkel central zerfallene Geschwürsflächen. An der Impfstelle der Flanke ein 2 Centim. langes Geschwür, beim Aufschlitzen stellte sich unter der unterminirten Haut eine grünbraune Geschwürsfläche dar, die ungefähr 4 Cent. breit und 5 Centim. lang war.

Rechter Lungenflügel dunkel braunroth; linker Lungenflügel hat in der Spitze eine Verdickung von gelbgraulicher Farbe und ist recht hart. Auf der Oberfläche der Leber weifsgraue Flecken. In der Milz etwas gröfsere weifsgraue Flecken. Im Blute sehr wenig zweigliederige bewegliche Kettchen. Blutkörperchen stechapfelförmig. Im Geschwürssecret zweigliederige bewegliche Kettchen. Lungenheerde mit Fettpartickeln infiltrirt. In den Leberflecken Fettzellen, in der Milz ebenfalls Fetttröpfchen. In den Nierenkanälchen Fettzellen und abgelöstes Epithel. Im Secret

des Geschwürs in der linken Flanke mehrgliedrige Ketten, außerdem auch zu zweigliedrigen Kettchen vereinigte bewegliche Micrococcen.

Verfuch 6. Den 21. December. Einem 2 Monat alten Hündchen wurde an beiden Ohren Scarificationen gemacht und Geschwürsbeleg des Pferdes Nr. II aufgestrichen. In die linke Flanke wurde eine Pravaz'sche Spritze voll mit Wasser verdünnten Geschwürssecrets und Nasenschleims, die zuerst durch Lein colirt wurden, injicirt. Im Geschwürsbeleg und Nasenschleim zweigliedrige bewegliche Kettchen.

Temperatur den 22. December 39,2

„	„	23.	„	39,4
„	„	24.	„	39,4
„	„	25.	„	40,0
„	„	26.	„	39,5
„	„	27.	„	39,2
„	„	28.	„	28,0

Am 2. Tage wurde in der linken Flanke ein Einschnitt gemacht und chocoladen-ähnliche, übelriechende Jauche entleert. Die Höhle wurde mit verdünnter Carbonsäurelösung ausgespritzt. Die Ohren sind entzündet. Am 3. Tage Ohren stark verdickt; stellenweise haben sich an den Ohrrändern blaurothe Anschwellungen gebildet; nach der Oeffnung der beulenartigen Anschwellungen entleerte sich trübe übelriechende Jauche; sie wurden in den nächsten Tagen zu umschriebenen ulcerirenden Geschwüren, die weiter um sich griffen. Secundär traten an den Ohrrändern Geschwüre auf. In der Flanke hat sich die Wunde immer mehr vergrößert, die Ränder sind callös; an den scarificirten Stellen sind oberflächliche circumscripte Geschwüre entstanden. Am Bauche und an der Brust sind secundär Geschwüre und rothe Flecke aufgetreten. Am 29. Dec. Tod: Section. Cadaver abgemagert; am linken Ohr befindet sich ein 3 Centim. langes Geschwür, das $\frac{1}{4}$ Centim. tief und mit dünnflüssigem Eiter ge-

füllt ist. $\frac{1}{2}$ Cent. davon entfernt befindet sich ein zweites groschen-großes Geschwür mit graugelblichen Eiter und Blutserum bedeckt. Am äußeren Rande ist ein Substanzverlust vorhanden; das Ohr ist stark verdickt. Das rechte Ohr ist ebenfalls stark verdickt; in den Einschnitten längliche Geschwüre mit zernagten Rändern. Der äußere Rand des Ohrs dunkelblauroth, stellenweise central zerfallene Geschwüre, welche circumscript und nicht tief sind. Auf dem Bauche in größerer Zahl Pusteln mit gelblichem Eiter gefüllt; auf der Brust und an der rechten Hinterextremität circumscripte Geschwüre. Leistendrüsen geschwollen. Die Wunde in der Flanke ist ungefähr 3 Cent. lang und $\frac{1}{2}$ Cent. breit, nach dem Eröffnen erwies sich eine 4 Cent. breite und 5 Cent. lange unterminirte dunkelbraune Fläche, die mit einer chocoladen-ähnlicher Flüssigkeit bedeckt ist. Lunge stellenweise dunkelbraunroth; Leber vollständig bedeckt mit weißen Punkten, stellenweise lehmfarbig. Auf der Milzoberfläche grauliche Flecke, ähnlich wie bei der Leber. Niere anämisch. Im Blute zweigliederige bewegliche Kettchen und Micrococcen. Die rothen Blutkörperchen stechapfelförmig. (Fig. II.) In den Leberzellen Eiterkörperchen und Fetttröpfchen. In den Lungenheerden Fettzellen. Im Geschwürssecret der Ohrgeschwüre zweigliederige, bewegliche Kettchen. (Fig. I.) Nierenkanälchen gefüllt mit Detritus und Fetttröpfchen.

Versuch VII. Den 21. December. Einem ein Jahr alten Hunde wurde ein die Haut durchtrennender Schnitt in die linke Flanke gemacht und Geschwürsbeleg mit Nasenschleim der rotzigen Pferde Nr. I und Nr. II (mit Wasser verdünnt) applicirt. Auf der inneren Fläche der Ohren wurden runde Epidermisstücke abgetragen und Geschwürssecret darauf applicirt.

Am 2. Tage nach der Impfung war die Umgebung der Wunde in der linken Flanke geschwollen. Die excoriirten Stellen der Ohren mit Blutserum bedeckt und die Umgebung entzündet. Am 3. Tage klaffte die Wunde in der linken Flanke mehr und die Ränder waren dick und dunkelroth; die excoriirten Flächen

der Ohren mit braunen Schorfen bedeckt. In den nächsten Tagen bildete sich aus der länglichen Wunde ein rundumschriebenes mit weißlichen Rändern versehenes Geschwür, dessen Grund speckig ausah. Dieses Geschwür nahm an Umfang zu, bis es die Gröfse eines kupfernen Kopekenstücks erreichte und fing dann an zu vernarben. Die Entzündung der Umgebung der excoriirten Stellen an den Ohren nahm allmählig ab und die excoriirte Fläche vernarbte. Das Thier blieb am Leben.

Temp. d. 22. Dec. 38,0

„ „ 23. „ 40,0

„ „ 24. „ 39,0

„ „ 25. „ 38,2

„ „ 26. „ 38,6

„ „ 27. „ 39,1

„ „ 28. „ 39,3

„ „ 29. „ 39,2.

Weitere Temperaturaufnahmen vom 30. December bis zum 7. Januar erwiesen 39, mit Schwankungen um Zehntelgrade.

Verfuch VIII. Den 21. Dec. Einem 10 Monat alten Hunde wurde ein die Haut durchtrennender $\frac{1}{2}$ Cm. langer Schnitt in die rechte Flanke gemacht und Geschwürssecret aus der Nasenhöhle des Pferdes Nr. II darauf applicirt. Auf den inneren Ohrflächen wurden Scarificationen gemacht und auf dieselbe von dem Geschwürsbeleg applicirt (Geschwürsbeleg mit Wasser verdünnt). Am 4. Tage war die Wunde unregelmäfsig begrenzt, mit verdickten Rändern und die Umgebung geschwollen. In den nächsten Tagen vergrößerte sie sich, wurde ganz rund mit grauweißlichen aufgewulsteten Rändern und speckigem Grunde; bedeckte sich nachher mit Eiter und wurde so groß, wie ein kupf. Kopekenstück. Am linken Ohr bildete sich an Stelle der Scarificationen ein charakteristisches Rotzgeschwür, welches ungefähr 4 Wochen nach der Impfung vernarbte. Das Geschwür in der rechten Flanke vernarbte 6 Wochen nach der Impfung.

Temp. d. 22. Dec. 39,0

„	„	23.	„	39,5
„	„	24.	„	39,5
„	„	25.	„	38,8
„	„	26.	„	38,6
„	„	27.	„	38,5
„	„	28.	„	39,2
„	„	29.	„	39,0
„	„	30.	„	39,5
„	„	31.	„	39,5
„	„	1.	„	39,0
„	„	2.	„	40,0
„	„	3.	„	39,8
„	„	4.	„	39,8
„	„	5.	„	39,3.

Weitere Temperaturaufnahmen erwiesen 39, mit Schwankungen nur um Zehntelgrade. Das Thier blieb gesund.

Aus der letzten Versuchsreihe ergibt sich, dafs bei den Hunden alle Versuche positive Resultate ergeben haben.

S c h l u f s.

Aus obigen Versuchen geht hervor: dafs Kaninchen sich mitunter immun gegen das Rotzgift zeigen. Dieselben sind dagegen empfindlich gegen Verwundungen und subcutanen Eiterinjectionen und gehen leicht an anderen Krankheiten, wie Phlegmone, Pyämie, Septicaemie etc. zu Grunde. Der auf Kaninchen inoculirte Rotz erzeugt manchmal Krankheiten, die ihren Erscheinungen nach der Pyämie, Phlegmone etc. gleichen. — Es entwickeln sich zwar in einzelnen Fällen locale fressende Geschwüre und Nasenrotz, selten dagegen trifft man Veränderungen auf den Schleimhäuten und in inneren Organen an. — In anderen Fällen erkranken Kaninchen gar nicht. Die Kaninchen sind daher nicht

zuverlässig und somit ungeeignet zu Impfungen mit Rotz behufs Sicherstellung der Diagnose dieser Krankheit.

Bei den Hunden blieb keine Impfung erfolglos. Einige gingen unter Bildung kleiner ulcerirender Geschwüre auf der Hautoberfläche mit einem speckigen Grunde, die einen verkrustenden milchfarbigen Eiter secernirten, unter allgemeiner Abmagerung an allgemeinem Rotz zu Grunde. — Der Tod erfolgte durch Metastasen nach den inneren Organen und allgemeinen Rotz.

Bei denjenigen Hunden, wo der Proceß local blieb, bildeten sich um sich greifende, mit speckigem Grunde versehene circumscripte Geschwüre, die einen dünnen gelblichen Eiter secernirten und in einigen Tagen bis Wochen wieder verheilten. Somit sind die Hunde, besonders junge, die geeignetsten Versuchsobjecte zur Sicherstellung der Diagnose des occulten Rotzes, namentlich bei subcutanen Applicationen und Impfungen auf Wundflächen.

Impfungen auf junge Hunde und falls solche zur Disposition stehen auf werthlosere Esel und alte Pferde können die Diagnose des occulten und zweifelhaften Rotzes stets mit Sicherheit feststellen.

Der Rotz ist nicht nur vom Pferde, sondern auch von rotzigen Kaninchen auf Hunde übertragbar.



THESEN.

1. Rotz, Tuberculose und Syphilis sind nicht Bacillen-Krankheiten im eigentlichen Sinne des Wortes.
 2. Junge Hunde sind die besten Versuchsobjecte für Impfungen in Fällen zweifelhaften Rotzes.
 3. Die Photogrammen der Micrococcen haben wenig practischen Werth.
 4. Als Wundmittel bei den Thieren in der Bauerpraxis ist am geeignetsten das sogenannte Streupulver, bestehend aus: Carbon. ligni, Alumin. crudi und Cort. Quercus ^{aa} partes.
 5. Das billigste Desinfectionsmittel ist der Sublimat.
 6. Die Ansicht, daß nach Impfung mit Rotz der Proceß bei Hunden an der Impfungsstelle localisirt bleibt, ist eine irrige.
-

- Fig. I.* Zweigliederige bewegliche Kettchen im Eiter der Pusteln des unter Versuch 6 verzeichneten Hündchens. (Hartnack Immer. XI).
- Fig. II.* Zweigliederige bewegliche Kettchen im Blute des Hündchens — unter V. 6 (desgl.).
- Fig. III.* Zu Kettchen aneinander gereihte Micrococcen in der serösen Flüssigkeit der Ohren der Kaninchen.
- Fig. IV.* Zweigliederige bewegliche Kettchen im Blute der Kaninchen.
- Fig. V.* Kettchen gebildet durch zwei bis sieben aneinander gereihte Micrococcen aus der chocoladefarbigen Jauche des Hundes Nr. des Versuches 4 (desgl.).
- Fig. VI.* Bacillen in einer Rotzneubildung. Zeiss Oel Immers. ($\frac{1}{18}$).
- Fig. VII.* v. Fig. VI. desgl.
- Fig. VIII.* Tuberkel Bacillen aus der Lunge eines Hahns (daselb.).
- Fig. IX.* Durchschnitt durch den Impftuberkel eines Meerschweinchens (mit Tuberkelbacillen.).
- Fig. X.* Rotzbacillen und Micrococcen aus den frischen geschwollenen Lümpfdrüsen eines Pferdes.
-

- Fig. I. Zweigliederige bewegliche Kettchen im Eiter der Pusteln des unter Versuch 6 verzeichneten Hündchens. (Hartnaek Immer. XI).
- Fig. II. Zweigliederige bewegliche Kettchen im Blute des Hündchens - unter V. 6 (desgl.).
- Fig. III. Zu Kettchen aneinander gereichte Micrococcen in der serösen Flüssigkeit der Ohren der Kaninchen.
- Fig. IV. Zweigliederige bewegliche Kettchen im Blute der Kaninchen.
- Fig. V. Kettchen gebildet durch zwei bis sieben aneinander gereichte Micrococcen aus der chocoladefarbigten Javelle des Hundes Nr. des Versuches 4 (desgl.).
- Fig. VI. Bacillen in einer Rotzaneubüchung. Zeiss Oel Immers. (11/18).
- Fig. VII. v. Fig. VI. desgl.
- Fig. VIII. Tuberkel Bacillen aus der Lunge eines Hahns (das selb.).
- Fig. IX. Durchschnitt durch den Impftuberkel eines Meerschweinchens (mit Tuberkelbacillen.).
- Fig. X. Rotzbacillen und Micrococcen aus den frischen geschwollenen Lymphdrüsen eines Pferdes.

Fig. I.




Fig. VI.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. VII.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.

